

(記載要領変更に伴う改訂)  
ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

### 第3類医薬品

#### 速乾性手指消毒剤

# ウィル・ステラV

エタノールを有効成分とする手指消毒剤です。手指に噴射することにより、指先まで十分にウィル・ステラVが行きわたり、簡便に手指消毒ができます。

#### ⚠ 使用上の注意

##### ☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

##### 次の部位には使用しないこと

- (1) 損傷のある皮ふ。
- (2) 目の周囲、粘膜等。



##### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ



ボトル:PE  
スプレー:PP  
キャップ:PP



4

MADE IN JAPAN

B

### 第3類医薬品

【効能又は効果】手指・皮ふの消毒

【用法及び用量】適量を手に取り、指先までムラなく乾くまで擦り込む。

<用法及び用量に関連する注意>

(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(2)目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。(3)外用にのみ使用すること。(4)血液や汚物等が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、水分を除去してから使用すること。

【成分及び分量】ウィル・ステラVは、有効成分としてエタノール(C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>O) 76.9~81.4 vol%、添加物としてグリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、アラントイン、リン酸を含有する。

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓し保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)取扱う場合、換気を十分行うこと。(5)火気に近づけないこと。(6)使用期限が過ぎた製品は、使用しないこと。(7)本剤はアルコールを含有しているため、床などの塗装面や衣服などについたりすると変色する場合があるので注意すること。

【お問い合わせ先】

本剤についてのお問い合わせは、お問い合わせのお店又は下記までご連絡いただけますようお願い申し上げます。

サラヤ株式会社 学術部  
TEL. 06-4706-3938  
受付時間 9:00~18:00  
(土、日、祝日を除く)

本剤は、リン酸でpHを酸性にしています。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
☎ 0120-149-931

### 第3類医薬品

#### 速乾性手指消毒剤

# ウィル・ステラV

60ml



引火性

#### 火気厳禁

危険物第4類  
アルコール類(エタノール)  
水溶性・危険等級Ⅱ

サラヤ株式会社  
大阪市東住吉区湯里2-2-8  
TEL.06-6797-2525