



80%エタノール 350mL

この容器は、製品とともに保管し、
ご使用の際には必ずお読みください。

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)次の部位には使用しないこと。
●損傷のある皮膚。●目の周囲、粘膜(目・口・鼻等)。

☒ 相談すること

1. 次の人は、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
●医師の治療を受けている人。●薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤・かゆみ



エレファジェルS 80%エタノール 350mL

【機能又は効果】手指・皮膚の殺菌・消毒
【用法及び用量】適量を消毒部位に塗布又は塗擦する。

〈用法及び用量に関する注意〉●外用にのみ使用すること。●目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。●広範囲又は長時間使用する場合は、蒸気の吸入に注意すること。●同一部位に反復使用した場合には、脱脂などによる皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。●小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用されること。

【保管及び取り扱い上の注意】●直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。●小児の手の届かない所に保管すること。●他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。●衣類等につくと脱色、変色するがあるので注意すること。●開封後はすみやかに使用すること。●火気に近づけないこと。

お客様相談窓口 ☎ 0120-50-0451 ポトル:PE
(受付時間 9:00~17:00 月~土・祝日・当社休業日を除く) ボンブ:PPM
ホームページ: <https://www.hakuzo.co.jp/> ラベル:PE

火気厳禁 副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931 002
危険物第4類、アルコール類(エタノール)、水溶性、危険等級II

JANコード



4 958286 057439

GS1-128



(01)04958286057439

【使用方法】



①キャップ②ノズル③ボトル
<使用する前に>
キャップ①をもってノズル③を印の方に向すとポンプが上がります。数回押すと液ができます。

