

第3類医薬品 **70%イソプロパノール消毒綿 エレファワイパーイン 4**

この箱は、製品とともに保管し、ご使用の際には必ずお読みください。

販売名：エレファワイパーイン

△ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと。

- 損傷のある皮膚。
- 目の周囲、粘膜等。



相談すること

1. 次の人は、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

その他の注意 臨床検査値への影響

注射部位に発赤を起こすことがあるので、アレルギーテストの診断を妨害することがある。

【成分及び分量】100mL中

《有効成分》日局イソプロパノール 70mL
医療脱脂綿 20g

【効能又は効果】手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

【用法及び用量】そのまま塗擦、清浄用として用いる。

〈用法及び用量に関連する注意〉

- 外用にのみ使用すること。
- 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- 広範囲又は長時間使用する場合は、蒸気の吸入に注意すること。
- 同一部位に反復使用した場合には、脱脂などによる皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- アルコール分がたんばく質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療機器に用いる時は、十分に洗い流してから使用すること。

Alcohol Swabs 002

100包入

JANコード



4cm×4cm

4 枚 4

958286 331010

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと
(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- 衣類等につくと脱色、変色することがあるので注意すること。
- 開封後はすみやかに使用すること。
- 火気に近づけないこと。

【副作用被害救済制度】 ☎ 0120-149-931

お客様相談窓口 ☎ 0120-50-0451
(受付時間 9:00~17:00 ※土・日・祝日・当社休業日を除く)
ホームページ <https://www.hakuzo.co.jp/>



【製造販売元】

ハクゾウメディカル株式会社

大阪市中央区徳井町2丁目4番9号