

12-1

ブッシュ綿棒 GO.05

PUSH SWAB GO.05

第2類医薬品 外皮用殺菌消毒剤

0.05%クロルヘキシジングルコン酸塩液

0.05% Chlorhexidine Gluconate solution

この箱は、製品とともに保管し、ご使用の際には必ずお読みください。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は使用しないこと。

- 本剤又は本剤の成分、クロルヘキシジンによりアレルギー症状を起こしたことがある人。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 患部が広範囲の人。
 - 深い傷やひどいやけどの人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

成分及び分量

ブッシュ綿棒GO.05の薬液は、100mL中に下記の成分を含有する。

有効成分	日本薬局方クロルヘキシジングルコン酸塩液(20%)	0.25mL
添加物	ラウロマクロゴール、赤色2号	

効能又は効果

すり傷、きり傷、かき傷、さし傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒

用法及び用量

本剤を付属の綿棒を用いて、1日数回患部に塗布してください。

〈用法及び用量に関連する注意〉

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- 外用にのみ使用すること。
- やけどのような痛みを伴う炎症をおこすことがあるので溶液の状態で長時間皮膚と接触させないこと。

保管及び取り扱い上の注意

使用期限 包装等に記載

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- 衣類等につくと変色することがあるので注意すること。
- 開封後はすみやかに使用すること。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

お客様相談窓口 ☎ 0120-50-0451

(受付時間 9:00~17:00 ※土・日・祝日・当社休業日を除く)

ホームページ <https://www.hakuzo.co.jp/>

[製造販売元]



ハクゾウメディカル株式会社
大阪市中央区徳井町2丁目4番9号