

フジアロー® 外傷液

⇨ここから開けてください


第2類医薬品

第2類医薬品

FIRST-AID SPRAY

フジアロー® 外傷液

色がつかないスプレー式
外傷救急薬



殺菌・消毒、切傷、すり傷に

外用専用 50mL

株式会社 富士薬品

効果的な使用方法



容器の口を上にして、容器を腕側の
に強く押してください。
内容薬液が霧状に出ます。



容器の口を下にして、容器を軽く
押してください。
そのまま内容薬液が流れます。



容器を軽く押し、内容薬液を脱脂
綿又はガーゼに浸してください。



キャップがきつい
場合には、ちよつ
とがいを押してく
ださい。あけ易く
なります。

50mL

配置期限

第2類医薬品

フジアロー® 外傷液

↑
差込んで保管してください

殺菌・消毒、切傷、すり傷に フジアロー外傷液 第2類医薬品

切傷、すり傷などには速やかな
処置が必要です。フジアロー外
傷液はスプレー式の殺菌消毒液
で、痛みを緩和して創傷面を保
護し、傷の修復をはやめます。

【使用上の注意】

【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師
又は登録販売者に相談すること。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を
起こしたことがある人。
(3) 患部が広範囲の人。
(4) 深い傷やひどいやけどの人。
2. 使用后、次の症状があらわれた
場合は副作用の可能性があり
ますので、直ちに使用を中止し、本
品を持って医師、薬剤師又は登
録販売者に相談すること。
皮膚：発疹・発赤、かゆみ、はれ
3. 5～6日間使用しても症状がよく
ならない場合は使用を中止し、
本品を持って医師、薬剤師又は
登録販売者に相談すること。

【成分・分量】100mL中

- ・ベンゼトニウム塩化物 100mg
 - ・ジブカイン塩酸塩 100mg
 - ・クロルフェニラミンマレイン酸塩 200mg
 - ・ナファゾリン塩酸塩 100mg
 - ・アラントイン 200mg
- 添加剤：エデト酸ナトリウム水和物、
エタノール 含有

製造販売元

株式会社 富士薬品

埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地
電話(048)648-1118(土、日、祝日を除く)

【効能・効果】

切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、
創傷面の殺菌・消毒

【用法・用量】

1日数回、適量を患部に噴霧す又は
ガーゼ・脱脂綿に浸して塗布してく
ださい。

【用法・用量に関連する注意】
(1) 用法を守ること。(2) 小児に
使用させる場合には、保護者の指
導監督のもとで使用させること。
(3) 目に入らないよう注意すること。
万一、目に入った場合には、すぐに
水又はぬるま湯で洗うこと。なお、
症状が重い場合には、眼科医の診
療を受けること。(4) 本剤は外用
にのみ使用すること。

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しい
所に密閉して保管すること。(2)
小児の手の届かない所に保管す
ること。(3) 他の容器に入れ替え
ないこと。(誤用の原因になったり
品質が変わるおそれがある。)(4)
配置期限を過ぎた製品は使用しな
いこと。

副作用被害救済制度

☎0120-149-931



60442