

フジアロー[®]
外傷液

⇨ここから開けてください

第2類医薬品

第2類医薬品
FIRST-AID SPRAY[®]
フジアロー[®]
外傷液

色がつかないスプレー式
殺菌消毒薬



殺菌・消毒、切傷、すり傷に

外用専用 50mL

富士薬品

使用期限

第2類医薬品
フジアロー[®]
外傷液

↑
差込んで保管してください

この説明書は、本剤とともに保管し、使用の際には、よくお読みください。

効果的な使用方法



容器の口を上にして、容器を瞬間的に強く押してください。内容薬液が霧状に出ます。



容器の口を下にして、容器を軽く押してください。そのまま内容薬液が流れます。



容器を軽く押し、内容薬液を脱脂綿又はガーゼに浸してください。



製造販売元
株式会社富士薬品
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地

殺菌・消毒、切傷、すり傷に
フジアロー外傷液
第2類医薬品

△【使用上の注意】

■【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(3) 患部が広範囲の人
(4) 深い傷やひどいやけどの人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、本品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
皮膚・発疹・発赤、かゆみ、はれ
3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、本品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【成分・分量】100mL中

ベンゼトニウム塩化物 100mg、ジブカイン塩酸塩 100mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 200mg、ナファゾリン塩酸塩 100mg、アラントイン 200mg
添加物：エデト酸ナトリウム水和物、エタノール 含有

【効能・効果】

切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒

【用法・用量】

1日数回、適量を患部に噴霧又はガーゼ・脱脂綿に浸して塗布してください

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 用法を守ること (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること (3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医師の診療を受けること (4) 本剤は外用にのみ使用すること

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること (2) 小児の手の届かない所に保管すること (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる) (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと

お問い合わせ先
株式会社富士薬品 (学術室)
048-648-1118
9:00～17:30 (土、日、祝日を除く)

画作用技術効果測定 0120-149-931



51201