

ご使用前に、必ずこの添付説明書をよく読んでください。
また、必要ときに読めるように大切に保管してください。

第3類医薬品 外皮消毒剤

アルウエッティ one2 インプロ

貯法: 火気をさけて保管
使用期限: 3年(包装等に記載)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

本剤の使用により、アレルギーテストの検査に影響を及ぼすことがある。

【成分及び分量】

- 成分:本品 100mL 中
 - 日本薬局方 イソプロパノール 70mL
 - 日本薬局方 精製水 適量
- 内容量: (2枚入) 1包中
 - 薬液 1.8mL
 - 医療脱脂綿 0.38g (4cm×4cm 2枚)

【効能又は効果】

手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

【用法及び用量】

そのまま塗擦、清浄用として使う。

*【使用上の注意】

- 用法及び用量に関連する注意
 - 外用にのみ使用すること。
 - 唇などの粘膜部分、目まわりには使用しないこと。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯でよく洗い、眼科医の診断を受けること。
 - 同一部位に反復使用した場合には、脱脂等による肌荒れを起こすことがあるので注意すること。
 - 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
 - 広範囲又は長時間使用する場合、酸化したアルコールの吸引に注意すること。
 - アルコール分がタンパク質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、医療機器等を清浄・清拭する際は血清、膿汁等を十分に洗い落としから使用すること。
- してはいけないこと
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)
- 1. 次の部位に使用しないこと。
創傷皮膚及び粘膜・目まわり
- 相談すること
 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - 1) 医師の治療を受けている人
 - 2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - 3) 薬や化粧品でアレルギー症状(発疹・発赤・かゆみ等)を起こしたことがある人
 2. 次の場合は直ちに使用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
※使用后、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤・かゆみ等

- その他の注意

*【保管及び取扱い上の注意】

1. 小児の手の届かない所に保管すること。
2. 直射日光をさけ、なるべく涼しい所に保管すること。
3. 火気の近く及び静電気の影響の強い場所での使用・保管・廃棄はしないこと。
4. 機器などに使用する場合は、あらかじめ目立たないところに使用し変化が無い事を確認の上使用すること。
5. 綿に小さな黒色又は黄色の斑点がみられる場合があるが、これは綿花の葉や種子の一部で、使用上の問題はない。
6. 使用后、トイレには流さないで衛生的に処理すること。

【包装】

200包/箱
60包/箱

【消費者相談窓口】

オオサキメディカル株式会社
〒452-0812 愛知県名古屋市中区玉池町203番地
(お客様相談室) Tel 0120-15-0039
(受付時間 10:00~17:00 土・日、祝日を除く)
(URL) <http://www.osakimedical.co.jp/>

*【製造販売業者及び販売業者の氏名又は名称及び住所】

販売元
オオサキメディカル株式会社
〒452-0812 愛知県名古屋市中区玉池町203番地
製造販売元
明星産商株式会社
〒783-0044 高知県南国市岡豊町八幡411-1

【副作用被害救済制度のお問合せ先】

(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
Tel 0120-149-931

販売名	アルウエッティone2 イソプロ		
アルコール	イソプロパノール	品番	31070
サイズ	4cm×4cm	入数	2枚入×60包

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)

1. 次の部位に使用しないこと。
創傷皮膚及び粘膜・目まわり
2. 再使用しないこと。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - 1) 医師の治療を受けている人
 - 2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - 3) 薬や化粧品でアレルギー症状(発疹・発赤・かゆみ等)を起こしたことがある人
2. 次の場合は直ちに使用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤・かゆみ等

その他注意

本剤の使用により、アレルギーテストの検査に影響を及ぼすことがある。

【効能又は効果】

手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

【用法及び用量】

そのまま塗擦、清浄用として使う。

〈用法及び用量に関連する注意〉

- 1) 外用にのみ使用すること。
- 2) 唇などの粘膜部分、目まわりには使用しないこと。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯でよく洗い、眼科医の診断を受けること。
- 3) 同一部位に反復使用した場合には、脱脂等による肌荒れを起こすことがあるので注意すること。
- 4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- 5) 広範囲又は長時間使用する場合には、気化したアルコールの吸引に注意すること。
- 6) アルコール分がタンパク質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、医療機器等を清浄・清拭する際は血清、膿汁等を十分に洗い落としてから使用すること。

【保管及び取扱い上の注意】

- 1) 小児の手の届かない所に保管すること。
- 2) 直射日光をさけ、なるべく涼しい所に保管すること。
- 3) 火気の近く及び静電気の影響の強い場所での使用・保管・廃棄はしないこと。
- 4) 機器などに使用する場合は、あらかじめ目立たないところに使用し変化が無い事を確認の上使用すること。
- 5) 綿に小さな黒色又は黄色の斑点がみられる場合があるが、これは綿花の葉や種子の一部で、使用上の問題はない。
- 6) 使用後、トイレには流さないで衛生的に処理すること。

【成分及び分量】

■成分

本品100mL 中
日本薬局方 イソプロパノール 70mL
日本薬局方 精製水 適量

■内容量

本品は、1包あたり0.38gの医療脱脂綿に、1.8mLの薬液を含浸したものである。

【使用期限】

箱の底面に表示。

【副作用被害救済制度のお問い合わせ先】

(独)医薬品医療機器総合機構

☎ 0120-149-931

製造販売元

明星産商株式会社

高知県南国市岡豊町八幡411-1

販売元

Osaki

オオサキメディカル株式会社

名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812

ホームページ <http://www.osakimedical.co.jp/>

お客様相談室 ☎ 0120-15-0039

(受付時間 10:00～17:00 ※土・日、祝日を除く)

火気厳禁

日本製