

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

殺菌消毒薬 ミナクラブ[®]

第2類医薬品

ミナクラブは、殺菌・消毒の作用を有する濃ベンザルコニウム塩化物液50、消炎作用を有するグリチルレチン酸、局所麻酔作用を有するジブカイン塩酸塩を配合した外用の殺菌消毒薬です。

⚠ 使用上の注意

相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 患部が広範囲の人。
(4) 深い傷やひどいやけどの人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
使用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症状 |
|------|-----------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

効能・効果

切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒

用法・用量

1日数回適量を患部に塗擦する。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守して下さい。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
- 本剤は外用にのみ使用して下さい。
- 患部やその周囲が汚れたまま使用しないで下さい。

成分・分量

100g中

| 成分 | 分量 |
|-----------------|------|
| 濃ベンザルコニウム塩化物液50 | 0.6g |
| グリチルレチン酸 | 0.3g |
| ジブカイン塩酸塩 | 0.1g |

添加物としてセタノール、流動パラフィン、ミリスチン酸イソプロピル、プロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、その他2成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 配置期限(ケースに記載)を過ぎた製品は使用しないで下さい。なお、配置期限内であっても、開封後はなるべく早く使用して下さい。

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの配置販売業者又は下記までご連絡下さい。

連絡先 日本ゼトック株式会社

電話 0120-886-440

受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00(土、日、祝日を除く)