

外用殺菌消毒薬

販売名：ポピドン液P「アグリス」

(10w/v% ポピドンヨード製剤)

承認番号	22900APX00366000
承認年月	2017年 10月
販売開始	2018年 5月

貯 法：直射日光を避けて室温保存
使用期限：外箱ならびに製品に記載

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は使用しないこと

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 患部が広範囲の人。
- (3) 深い傷やひどいやけどの人。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

切傷、さし傷、すりむき傷、靴ずれ、やけど等の患部の殺菌・消毒
とびひ、おでき等の感染皮膚面の殺菌・消毒

【用法・用量】

1日数回患部に塗布する。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (3) 外用にのみ使用し、内服しないこと。
- (4) 石けん類は本剤の殺菌作用を弱めるので、石けん分を洗い流してから使用すること。

【成分】

ポピドンヨード 10w/v% 添加剤として、ラウロマクロゴール、クエン酸水和物 (pH調節剤)、水酸化ナトリウム (pH調節剤) を含む。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない室温の場所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
- (5) 使用するときには開封し、残液は使用しないこと。
- (6) 衣類等に付着したときは、水で洗い流すこと。
- (7) 容器の開封時は、容器から液が飛び出すことがあるので、注意すること。

【製品に関するお問い合わせ先】

株式会社アグリス
電 話 0943-30-1100
受付時間 9:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

製造販売元

株式会社アグリス

〒834-0055 福岡県八女市鵜池 477-1