

この説明文書は使用前に必ずお読みください。また必要なとき読めるように保存しておいてください。

第3類医薬品

キズ・やけどの殺菌・消毒に 外用殺菌消毒薬

イソジン® 軟膏

イソジン軟膏の有効成分「ポビドンヨード」は、世界各国で使用されている殺菌消毒薬です。いろいろな細菌やウイルスに対して幅広く、短時間ですぐれた殺菌・消毒効果を発揮します。きり傷・すりむき傷・やけどなどの患部の殺菌・消毒にすぐれた効果を発揮します。

特
徴

- 各種の細菌, 真菌, ウイルスなど広範囲の微生物に対し, 迅速な殺菌・消毒効果を発揮します。
- 刺激性が弱く, 皮膚の消毒に適しています。
- イソジンの色は, 消毒範囲を示し, 塗り残しを防げます。
また, 衣服についたものは, 水で容易に洗い落とせます。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり, 副作用がおこりやすくなります)

次の人は使用しないでください

本剤または本剤の成分によりアレルギー症状をおこしたことがある人

相談すること



1. 次の人は使用前に医師, 薬剤師または登録販売者にご相談ください

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人
- (3) 患部が広範囲の人
- (4) 深い傷やひどいやけどの人

2. 使用后, 次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので, 直ちに使用を中止し, この文書を持って医師, 薬剤師または登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤, かゆみ

まれに下記の重篤な症状がおこることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに, 皮膚のかゆみ, じんましん, 声のかすれ, くしゃみ, のどのかゆみ, 息苦しさ, 動悸, 意識の混濁などがあらわれる。

3. 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し, この文書を持って医師, 薬剤師または登録販売者にご相談ください

効能・効果

きり傷, さし傷, すりむき傷, 靴ずれ, やけどなどの患部の殺菌・消毒

用法・用量

1日数回, 適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に使用させる場合には, 保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 本剤は外用のみに使用し, 内服, うがいや粘膜の殺菌・消毒には使用しないでください。
- 目に入らないようにご注意ください。万一, 目に入った場合には, すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお, 症状が重い場合には, 眼科医の診療を受けてください。

成分・分量

1g中 ポビドンヨード100mg(有効ヨウ素として10mg)
添加物として マクロゴール, pH調整剤を含有しています。

保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変化します。)
- (4)衣服などに付着すると着色しますのでご注意ください。
なお, 付着した場合にはすぐに水でよく洗い落としてください。
- (5)使用期限をすぎた製品は, 使用しないでください。

〈お問い合わせ先〉

本品についてのお問い合わせは, お買い求めのお店,
または下記までお願いいたします。

シオノギヘルスケア株式会社「**医薬情報センター**」

電話: [大阪] 06-6209-6948 受付時間: 9時~17時(土, 日, 祝日を除く)
[東京] 03-3406-8450

「副作用被害救済制度」について

(独)医薬品医療機器総合機構

電話: 0120-149-931(フリーダイヤル)

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

®:「インジン」はムンディファーマの登録商標です。