

貯法	室温保存
使用期限	容器に記載

第2類医薬品

日本標準商品分類番号
872619

承認番号:22200APX00608000
承認年月:2010年9月
販売開始:2010年10月

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要などに読めるように大切に保管してください。

HAKUJUJI ヘキシジン綿球

外用消毒剤〈高圧蒸気滅菌処理済〉

【特徴】

HAKUJUJI ヘキシジン綿球は薬液を吸着しにくい綿球を使用し、外用消毒剤である0.05w/v%クロルヘキシジングルコン酸塩液を併せて包装し、高圧蒸気滅菌処理をした製品です。
薬液含浸済ですので、開封後そのまま使用できます。

【使用上の注意】

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

次の人は使用しないこと

* 本剤又は本剤の成分、クロルヘキシジンによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

次の部位には使用しないこと

- ・陰、膀胱、口腔等の粘膜面
- ・広範囲の患部、深い傷やひどいやけど、ひどいただれ
- ・目のまわり

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬や化粧品でアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ等)を起こしたことがある人

* 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(1) 使用後、次の症状が現れた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。

その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	* 使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

(2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

【効能・効果】

すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌、消毒

【用法・用量】

本剤を1日数回、そのまま患部に塗布して用いる。

（用法・用量に関する注意）

- (1) 外用にのみ使用すること。
- (2) 目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯でよく洗い、直ちに眼科医の診療を受けること。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (4) 石けん類や血清、膿汁等が付着していると、十分な効果が得られないことがあるので、十分に洗い流してから使用すること。
- ** (5) やけどのような痛みを伴う炎症をおこすことがあるので、溶液の状態で長時間皮膚と接触させないこと。
- (6) 一度個包装を開封したものは、無菌状態が保てないので、開封後は直ちに使い切ること。
- (7) 個包装が開封、破損や他の汚染が見られる場合は使用しないこと。

【成分・分量】

本剤は、下記の成分を含有する。

成分	溶液 100mL 中の分量
日局 クロルヘキシジングルコン酸塩液 (20w/v%)	0.25mL (薬液として0.05w/v%)

薬液の担体としてPET綿球を含む。

PET綿球1gに対して薬液10mL含浸。

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1) 直射日光を避け、湿気の少ないなるべく涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 誤用や品質の低下を避けるため、再使用や他の容器に移し替えをしないこと。
- (4) 使用後は、トイレに流さないで、衛生的に処理すること。
- (5) 綿球、薬液等を継ぎ足して使用しないこと。
- (6) 本品は、小売での開封小分け販売はできない。

【包装】


2球/1パック 20パック入り

【消費者相談窓口】

白十字株式会社 〒171-8552 東京都豊島区高田3-23-12
お客様相談室 TEL 0120-01-8910(フリーダイヤル)
受付時間 9:00～17:00(月～金 ※祝日を除く)
(休日・夜間 TEL 03-3987-6111)

【製造販売業者等の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 白十字株式会社
〒171-8552 東京都豊島区高田3-23-12

副作用被害救済制度の問合せ先 (独)医薬品医療機器総合機構	電話  0120-149-931
----------------------------------	--