

使用に際しては、この説明文書を必ずお読み下さい。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

日本標準商品分類番号

872612

### 第3類医薬品 外用用殺菌消毒剤

## オオサキ薬液綿棒ポビドン 10% 1015

## オオサキ薬液綿棒ポビドン 10% 1415

(綿棒付き 10% ポビドンヨード製剤)

貯 法：直射日光を避け、室温保存  
使用期限：外箱ならびに製品に記載

オオサキ薬液綿棒ポビドン 10% 1015 承認番号 30100APX00259000 承認年月 2019年 12月 販売開始 2020年 5月	オオサキ薬液綿棒ポビドン 10% 1415 承認番号 30100APX00269000 承認年月 2019年 12月 販売開始 2020年 5月
--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

### 使用上の注意



#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用  
が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと  
本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を  
起こしたことがある人



#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録  
販売者に相談すること  
(1) 医師の治療を受けている人  
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こした  
ことがある人  
(3) 患部が広範囲の人  
(4) 深い傷やひどいやけどの人
2. 使用後、次の症状が現れた場合は副作用の  
可能性があるため、直ちに使用を中止し、この  
箱を持って医師、薬剤師または登録販売者に  
相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。  
その場合は直ちに医師の診察を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに皮膚のかゆみ、 じんましん、声のかすれ、 くしゃみ、のどのかゆみ、 息苦しさ、動悸、意識の 混濁等があらわれる。

3. 5~6日間使用しても症状が良くならない  
場合は使用を中止し、この箱を持って医師、  
薬剤師または登録販売者に相談すること

### 効能・効果

きり傷、すりむき傷、さし傷、靴ずれ、やけど等の患部の  
殺菌・消毒。

とびひ、おでき等の感染皮膚面の殺菌・消毒。

### 用法・用量

一日数回患部に塗布。

<用法用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督の  
もとに使用させること。
- (3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った  
場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、  
症状が重い場合には、眼科医の診察を受けること。
- (4) 石けん類は本剤の殺菌作用を弱めるので、石けん分を  
洗い流してから使用すること。
- (5) 外用にのみ使用すること。

### 組 成

オオサキ薬液綿棒 ポビドン 10% 1015	担体	綿棒
	有効成分	ポビドンヨード10w/v%
	容量	綿棒1本あたり薬液1.5mL
オオサキ薬液綿棒 ポビドン 10% 1415	担体	綿棒
	有効成分	ポビドンヨード10w/v%
	容量	綿棒1本あたり薬液4.5mL

添加物：グリセリン、ラウロマクロゴール、クエン酸、  
リン酸水素ナトリウム

### 保管及び取扱い上の注意


- (1) 直射日光のあたらない、涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 誤用の原因になったり品質が変わるため、他の容器  
に入れないこと。
- (4) 衣類等に付着したときは、水で洗い流すこと。
- (5) 使用期限の過ぎた製品は使用しないこと。
- (6) 綿に指が触れないように使用し、再使用はしない  
こと。
- (7) 薬液押し出し後又は開封後は、速やかに使用する  
こと。
- (8) 薬液が漏れるおそれがあるため、薬液ポケットを  
下にして保管すること。

### 取扱い方法



本製品の薬液の押し出しを確実にするため、  
次の手順でご使用ください。

- 1 薬液ポケットを押して液を  
綿にしみこませる



- 2 フィルムをめくり綿棒を  
取り出す

薬液ポケットの押さえ方や使用環境(低温下など)に  
よっては、力が加わりすぎてフィルムが破れるなどの  
原因となり、薬液が漏れ出すことがあります。

注1) 万が一、薬液ポケットから液が染み出ている場合は、  
ご使用を控えてください。

注2) フィルム特性により低温下ではきれいに剥がれない  
ことがあります。

### PRECAUTIONS FOR USE

#### Prohibitions:

If you break this prohibitions, your condition may worsen  
or occur side effects.

Do not use the product if you had allergic reactions by  
using this product or by ingredient of this product.

副作用被害救済制度の問合せ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931

販売元

Osaki

オオサキメディカル株式会社

名古屋西区玉池町203番地 〒452-0812

ホームページ <http://www.osakimedical.co.jp/>

お客様相談室 0120-15-0039

(受付時間 10:00~17:00 ※土・日、祝日を除く)

日本製

MADE IN JAPAN -  
164010-01

W125×H255×D110

製造販売元 平和メディック株式会社

岐阜県高山市山田町1382番地6 〒506-0058