

使用に際しては、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

一般外用剤 第3類医薬品

メディクスワブ エタノール 4.5

(綿棒付きIPA添加消毒用エタノール製剤)

日本標準商品分類番号

872615



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなる)

1. 次の部位には使用しないこと

- (1) 損傷のある皮膚。
- (2) 目の周囲、粘膜等。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用后、次の症状が現れた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

その他の注意

本剤の使用により、アレルギーテストの検査に影響を及ぼすことがある

効能・効果

手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

用法・用量

本剤を付属の綿棒で、塗抹、清浄用として用いる。

<用法用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (4) 外用にのみ使用すること。
- (5) 本剤は1包につき、1回の使用とし、薬液押し出し後又は開封後はできるだけ速やかに使うこと。
- (6) 過度に使用した場合、脱脂などによる皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること

組 成

担体	綿棒
メディクスワブ エタノール4.5	有効成分 100ml中エタノールを83ml(76.9~81.4vol%)含有
容量	綿棒 1本あたり薬液4.5mL

添加物：イソプロパノール

保管及び取扱い上の注意


- (1) 直射日光のあたらない、涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。
- (4) 衣類等に付着すると、脱色及び変色することがあるので注意すること。
- (5) 使用期限の過ぎた製品は使用しないこと。
- (6) 綿に指が触れないように使用し、再使用はしないこと。
- (7) 薬液押し出し後又は開封後は、速やかに使用すること。
- (8) 薬液が漏れるおそれがあるため、薬液ポケットを下にして保管すること。
- (9) 火気に近づけないこと。

取扱い方法




本製品の薬液の押し出しを確実にするため、次の手順でご使用ください。

- 1 薬液ポケットを押して液を綿にしみこませる



- 2 フィルムをめくり綿棒を取り出す



薬液ポケットの押さえ方や使用環境(低温下など)によっては、力が加わりすぎてフィルムが破れるなどの原因となり、薬液が漏れ出すことがあります。

- 注1) 万が一、薬液ポケットから液が染み出ている場合は、ご使用を控えてください。
- 注2) フィルム特性により低温下ではきれいに剥がれないことがあります。

アルコール類
危険等級Ⅱ
水溶性
火気厳禁

製造販売元 平和メディック株式会社

〒506-0058 岐阜県高山市山田町1382番地6

【お問い合わせ先】

電話／0120-380-512

受付時間／9:00～17:00

(土・日、祝日、当社休日を除く)



外箱



個包装
内装



4 976558 004387

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931