

P

第3類医薬品

日本薬局方

白色ワセリン

White Petrolatum

500g



健栄製薬株式会社
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5822

手足のヒビ、アカギレに

使用に際しては、説明書をよく読んでください。

⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(2) 湿潤やただれのひどい人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

【効能効果】 手足のヒビ、アカギレ、皮膚のあれ、その他皮膚の保護

【用法用量】 そのままを患部にうすく塗ってください。

製造番号

使用期限

〈用法用量に関連する注意〉

(1) 用法用量を厳守してください。

(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。

(4) 外用にのみ使用してください。

【成分分量】 1g中 日局白色ワセリン 1g含有
[抗酸化剤としてジブチルヒドロキシトルエン0.01mg配合。]

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)

(4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

〈貯法〉 気密容器。室温保存。

第3類医薬品

日本薬局方

白色ワセリン



キャップ：PP
パッキン：PE
ボトル：PE
ラベル：PS



4 987286 307794

〔成分分量〕 1g中

日局白色ワセリン 1g含有

〔抗酸化剤としてジブチルヒドロキシルエ
ン0.01mg配合。〕

〔保管及び取扱い上の注意〕

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓し
て保管してください。(2)小児の手の届かな
い所に保管してください。(3)他の容器に入
れ替えないでください。(誤用の原因になっ
たり品質が変わることがあります。)(4)使用
期限を過ぎた製品は使用しないでください。
〈貯法〉 気密容器。室温保存。

※この商品は(株)マツキヨココカラ&カンパニー
のオリジナル商品です。

製造販売元：健栄製薬株式会社
大阪府中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5822
受付時間 9：00～17：00
(土日祝日・年末年始・夏季など特別休業日を除く)

White Petrolatum

For cracked and chapped hands and feet.

ご使用に際して、外箱の説明文を
必ずお読みください。

また、必要な時に読めるよう大切
に保存してください。

日本薬局方

白色ワセリン

第3類医薬品



使用上の注意

相談すること 1. 次の人は使用前に医師、
薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)薬などによりアレルギー症状を起こした
ことがある人。(2)湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副
作用の可能性があるので、直ちに使用を中
止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は
登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

〔効能効果〕 手足のヒビ、アカギレ、皮膚の
あれ、その他皮膚の保護〔用法用量〕 その
ままを患部にうすく塗ってください。〈用法
用量に関連する注意〉(1)用法用量を厳守し
てください。(2)小児に使用させる場合には、
保護者の指導監督のもとに使用させてくだ
さい。(3)目に入らないように注意してくだ
さい。万一、目に入った場合には、すぐに水
又はぬるま湯で洗ってください。なお、症
状が重い場合には、眼科医の診療を受けて
ください。(4)外用にのみ使用してください。