

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限を過ぎた製品は使用しないこと

第2類医薬品

外皮用薬

アットノン EX ジェル

販売名:アットノンEX

非ステロイド剤

特徴

傷あととは、傷が修復されるときに皮膚組織が異常に増殖することによって、傷口に赤みや盛り上がりが残った状態のことをいいます

アットノンは、傷あとに効果的な3つの有効成分が傷あとを治していきます

- (1)ヘパリン類似物質が、ターンオーバーを促進して正常な皮膚の再生を促します
 - (2)アラントインが、傷ついた皮膚の組織を修復します
 - (3)GK2※が、傷あとに残った炎症を鎮めます※グリチルリチン酸二カルシウム
- 肌のターンオーバーを意識して塗り続けることで、徐々に傷あとに効いていきます

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと

- (1)出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病等)の人
- (2)わずかな出血でも重大な結果をきたすことが予想される人
(血液凝固抑制作用を有し出血を助長するおそれがある)

2. 次の部位には使用しないこと

目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣等)



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1)医師の治療を受けている人 (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3)湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

(裏面につづく)

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

きず・やけどのあとの皮ふのしこり・つっぱり(顔面を除く)、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手指の荒れ、手足のひび・あかぎれ、乾皮症、小児の乾燥性皮ふ、しもやけ(ただれを除く)、打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛

用法・用量

1日1～数回、適量を患部にすりこむか、又はガーゼなどにのばして貼ってください

＜用法・用量に関連する注意＞

(1) 使用のつどキャップをしっかりとしめること (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること (3) 目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること (4) 外用にのみ使用すること

成分・分量 100g 中

成 分	分量	はたらき
ヘパリン類似物質	0.3g	ターンオーバー促進作用、血行促進作用、水分保持作用があります
アラントイン	0.2g	傷ついた皮ふ組織の修復を助けます
グリチルリチン酸二カリウム	1g	肌の炎症を鎮めます

添加物として、ヒプロメロース、カルボキシビニルポリマー、プロピレングリコール、イソプロパノール、トリイソプロパノールアミン、香料を含有する

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

発売元 小林製薬株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4・10

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-01

9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 小林製薬株式会社

〒562-0029 大阪府箕面市彩都業生北4-66

MADE IN JAPAN

10233319