

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要なときに読めるよう大切に保管して下さい。

第3類医薬品

メンタームEは、消炎鎮痛作用、血行改善作用により、ひび、あかぎれの痛みを抑え、かゆみを和らげます。家庭常備薬として広くお使いいただけます。

家庭常備薬

メンターム E



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないこと

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 湿潤やただれのひどい人。

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

《効能・効果》

しもやけ、あかぎれ、ひび、かゆみ

《用法・用量》

患部を清潔にしたのち、1日2～3回適量をすりこむ。

又は症状に応じてガーゼに適量を塗布して患部に貼付する。

《用法及び用量に関連する注意》

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

《成分・分量》 100g 中

成 分	分 量	は た ら き
ℓ-メントール	1.3g	皮膚刺激作用により血液の流れを良くし、かゆみを和らげます。
dl-カンフル	6.8g	
サリチル酸メチル	1.2g	消炎鎮痛作用があります。
添加物として、ワセリン、パラフィンを含有する。		

《保管及び取扱い上の注意》

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)

本剤についてのお問い合わせは、
お買い求めのお店又は下記までご連絡ください。

株式会社 雪の元本店 お客様相談室
〒634-0815 奈良県橿原市大谷町182番地
TEL 0744-22-2440 FAX 0744-22-2406

受付時間 9:00～12:00 13:00～17:00
(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
☎0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造販売元 **株式会社 雪の元本店**

奈良県橿原市大谷町182番地