

使用前にこの説明書をよくお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。



ひび・あかぎれ治療薬

第3類医薬品

メンソレータム®

ヒビプロ®

水仕事などで手を酷使するあなたに

ヒビプロは、つらいひび・あかぎれの症状を殺菌・修復・保護のトリプル作用により、効果的に改善する治療薬です。

ぴったりと患部に密着する落ちにくい処方設計で、水仕事や乾燥からくるダメージを受けた皮フを修復していきます。


トリプル作用でひびに効く

1
殺菌




(イソプロピルメチルフェノール)
患部の雑菌の繁殖を防ぎます

2
修復



(トコフェロール酢酸エステル)
患部の修復を促します

3
保護



(ワセリン基剤)
ワセリンの膜がぴったりと密着し、
患部をしっかりカバー
外からの刺激を和らげます

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと。

(1) 目や目の周囲、口唇などの粘膜の部分等 (2) 湿疹、かぶれ



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

(1) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

(2) 湿潤やただれのひどい人

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮フ	発疹・発赤、かゆみ

効能・効果

ひび、あかぎれ、しもやけ、かゆみ

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布又は塗擦してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (3)外用にのみ使用すること。

成分・分量(100g中)

- トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE誘導体)…2.0g
- イソプロピルメチルフェノール…0.1g
- l*-メントール…1.35g
- d**l*-カンフル…9.6g
- サリチル酸メチル…3.0g

添加物として、ワセリン、サラシミツロウ、流動パラフィン、パラフィン、タルク、ポリエチレン、パルミチン酸デキストリン、ジメチルポリシロキサン、ユーカリ油、テレピン油を含有する。

保管及び取り扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
 - (2)小児の手の届かない所に保管すること。
 - (3)本剤のついた手で、目や粘膜に触れないこと。
 - (4)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)
 - (5)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早く使用すること。
- ※ 冬期など気温が低い時に製剤が硬くなって出しにくい時は、手で温めてからご使用ください。

お問い合わせ先:お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)