

使用前にこの説明書をよくお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

かかと・ひじ・ひざの荒れ、ひび割れに

ひび・あかぎれ治療薬



メンズラインタム[®]
ビビプロ[®]KT α

第3類医薬品

しっかり覆うワセリンベースの軟膏

かかとなどのつらいひび割れに

かかとは、体重を支えるために角質が厚く、また、皮脂が分泌されないため乾燥しやすく硬くなり、衝撃を受けることで荒れやひび割れが起こり痛みを感じやすくなります。そんな痛くてつらいかかとの荒れやひび症状を考えて生まれたのがビビプロ[®]KT α です。患部をしっかり覆い保護しながら、有効成分をとどめて、かかと・ひじ・ひざの荒れ、ひび割れ等の症状を効果的に改善します。



〈密封カバーラー〉+〈6つの有効成分〉で効く

ワセリンベースの軟膏製剤がまるで患部を密封するかのように覆い、6つの有効成分をとどめて、つらいかかと・ひじ・ひざの荒れ、ひびを修復していきます。

新陳代謝を促進し
荒れた皮ふをなめらかにする

ビタミンA油

血行促進し、
ひびの修復を促す

ビタミンE誘導体

炎症を鎮める

グリチルレチン酸



しっかり覆って有効成分をとどめる
ワセリンベースの処方設計

皮ふ修復成分W配合

アラントイン
+
パンテノール

殺菌作用

イソプロピルメチルフェノール



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

- (1) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2) 湿潤やただれのひどい人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮 フ	発疹・発赤、かゆみ

効能・効果

ひじ・ひざ・かかとのあれ、ひび、あかぎれ、指先・手のひらのあれ、しもやけ

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (3) 外用にのみ使用すること。

成分・分量(100g中)

- ビタミンA油…0.5g(ビタミンAとして500000国際単位)
 - トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE 誘導体)…2.0g
 - アラントイン…0.2g
 - パンテノール(プロビタミンB5)…1.0g
 - グリチルレチン酸…0.3g
 - イソプロピルメチルフェノール…0.1g
- 添加物として、ワセリン、流動パラフィン、サラシミツロウ、パラフィン、パルミチン酸イソプロピル、グリセリン、ポリエチレン、マイクロクリスタリンワックス、ショ糖脂肪酸エステル、パルミチン酸デキストリン、パラベン、BHTを含有する。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 本剤のついた手で、目や粘膜に触れないこと。
- (4) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早く使用すること。

ヒビプロ®KT α はカバーラーの高さにこだわっているためハードタイプの軟膏製剤になっています。冬期など気温が低い時に製剤が硬くなってしまい出しにくい時は、手で温めてからご使用ください。

お問い合わせ先:お客様安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などを
お聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)