

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

エメロット HPクリーム

外皮用薬

特徴

- ◎有効成分のヘパリン類似物質が3つの作用で傷あと・やけどあとなどを目立たなくします。
 血行促進：血流を改善し皮膚の再生を促します。
 抗炎症作用：皮膚の炎症を鎮めることで正常な状態にします。
 保湿作用：皮膚の角質の水分を保持し柔軟性を与えます。
- ◎ステロイドは配合していません。
- ◎よくのびて、ベタつかないクリームです。



使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

- (1) 出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病など)の人。
- (2) わずかな出血でも重大な結果をきたすことが予想される人。
(血液凝固抑制作用を有し出血を助長するおそれがあります。)

2. 次の部位には使用しないでください

目や目の周囲、粘膜(口腔、鼻腔、膈など)。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 湿潤やただれのひどい人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、紫斑

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

きず・やけどのあとの皮膚のしこり・つっぱり(顔面を除く)、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、乾皮症、小児の乾燥性皮膚、手指の荒れ、手足のひび・あかぎれ、しもやけ(ただれを除く)、打ち身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛

【用法・用量】

1日1～数回、適量を患部にすりこむか、又はガーゼなどにのぼして貼ってください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を守ってください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)外用にのみ使用してください。
※出血のある傷口には使用しないでください(血が止まりにくくなる可能性があります。)
※かさぶたには使用しないでください。
※顔面にある傷あと、やけどのあとには使用しないでください。

【成分・分量】100g中

成 分	分 量
ヘパリン類似物質	0.3 g

添加物としてワセリン、流動パラフィン、ジメチルポリシロキサン、ミリスチン酸オクチルドデシル、BHT、ポリオキシエチレンアラキルエーテル、ステアリルアルコール、ポリソルベート60、パラベン、1,3-ブチレングリコール、カルボキシビニルポリマー、水酸化Na、香料を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わるのを防ぐため。)
- (4)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

このお薬についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記へお願いいたします。

奥田製薬株式会社 お客様相談窓口

☎ (06) 6351-2100 (代表) (午前9時から午後5時まで、土日祝日を除く)