

ご使用に際し、この説明文書を必ずお読みください。また、必要ときに読めるよう大切に保管してください。

**▲【使用上の注意】**

**してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。) 次の部位には使用しないでください

(1)目や目の周囲、口唇などの粘膜の部分等。(2)湿疹、かぶれ。

**相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

(1)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(2)湿潤やただれのひどい人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

発売元  
ラクール薬品販売株式会社  
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

◆お問い合わせ先◆  
フリーダイヤル 0120-86-8998

製造販売元  
三友薬品株式会社  
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

副作用被害救済制度  
電話 0120-149-931

**【効能・効果】** ひび、あかぎれ、しもやけ、かゆみ

**【用法・用量】** 1日数回、適量を患部に塗布または塗擦してください

<用法・用量に関連する注意>

(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(2)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合にはすぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(3)外用にのみ使用してください。

**【成分・分量】** 100g中

0-メントール・・・・・・・・・・・・・・・・・・1.35g d0-カンフル・・・・・・・・・・9.6g  
サリチル酸メチル・・・・・・・・3.0g トコフェロール酢酸エステル・・・・・・・・2.0g  
インプロピルメチルフェノール・・・・・・・・0.1g  
添加物：1,3-ブチレングリコール、グリセリン、トリイソオクタン酸グリセリン、ベンゼン酸、セトステアリルアルコール、ペヘニルアルコール、ジメチルポリシロキサン、パラベン、ステアリン酸グリセリン、ステアリン酸ポリオキシシル、pH調節剤



ひどく割れたひび・かゆみの治療に

ナティール△ ひび・あかぎれ軟膏

RAKCOOL

第3類医薬品

17g

**【保管及び取扱い上の注意】**

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)本剤のついた手で、目や粘膜にふれないでください。
- (4)他の容器に入れかえないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (5)使用期限(外箱及び容器に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。



製造  
番号  
使用  
期限