

ここから
開けてください

第3類医薬品

25g

タイドム® ひび・あかぎれAT軟膏

ご使用に際し、この説明文書を必ず
お読みください。また、必要なときに
読めるよう大切に保管してください。

⚠️【使用上の注意】

相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
 - 薬などによりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人。
 - 湿潤やただれのひどい人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

発売元
ラウール薬品販売株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

◆お問い合わせ先◆
フリーダイヤル 0120-86-8998

製造販売元
三友薬品株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

RAKCOL ひどく割れたひび あかぎれの治療に

タイドム® ひび・あかぎれ AT軟膏

かかじ・かかじ ひび割れ治療薬



皮ふなめらかな成分
ビタミンA油配合

血行促進成分

組織修復成分

抗炎症成分

25g

第3類医薬品

【保管及び取扱上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
 - 小児の手の届かない所に保管してください。
 - 本剤のついた手で目や粘膜にふれないでください。
 - 他の容器に入れ替えないでください（混用の原因になったり品質が変わることがあります）。
 - 使用期限（外箱及び容器に記号）を過ぎた製品は使用しないでください。
- ※低温時に軟膏が硬く出しにくい際は、手で温めてください。



製造
番号
使用
期限

【効能・効果】ひび・ひどく・かかとのあれ、ひどく・あかぎれ、指先・手のひらのあれ、しもやけ
【用法・用量】1日数回、適量を患部に塗布してください
【用法・用量】に關連する注意）

(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(2)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(3)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

【成分(分量)】100g中
ヒコファン油…0.5g(ヒコファンAとして5000000国際単位)
ラウチルリン酸二カルシウム…0.5g アラントイン…0.2g
添加物:シメチルポリシリコン、流動パラフィン、中鎖
脂肪酸モノグリセリド、セオラン、ポリブチレン、
BHT、パラベン、パラフィン、白色ワセリン