

ご使用に際し、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要などときには読めるよう大切に保管してください。

△【使用上の注意】

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
(1)薬などによりアレルギー症状(発疹・発赤・かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。(2)湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤・かゆみ

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)本剤のついた手で、目や粘膜にふれないでください。
- (4)他の容器に入れかえないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (5)使用期限(外箱及び容器に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

製造販売元
三友薬品株式会社 お客様相談窓口
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号 電話 03-3899-9333

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931

【成分・分量】100g中

トコフェロール酢酸エステル…0.2g アラントイン…0.2g
パンテノール……………1.0g グリセリン…40.0g
グリチルリチン酸二カリウム…0.5g イソプロピルメチルフェノール…0.1g
添加物：ステアリルアルコール、ベヘニルアルコール、ベヘン酸、ステアリン酸グリセリン、ステアリン酸ポリオキシル、ミリスチン酸イソプロピル、ジメチルポリシリコサン、パラベン、エドテ酸Na水和物、pH調節剤

血行促進成分+皮ふ組織修復成分 **W** 配合

アラントイン + パンテノール

ひび・あかぎれ治療薬

イメージ図

クリームタイプの**治療薬**

血行促進成分+皮ふ組織修復成分 **W** 配合

ラクセスト ひび・あかぎれ **W**

第3類医薬品 6種の有効成分が効く

大容量 **40g**

【機能・効果】ひび、あかぎれ、しもやけ

【用法・用量】1日数回、適量を患部に塗布してください

<用法・用量に間違する注意>

- (1)定められた用法・用量をお守りください。
- (2)小児に使用される場合には、保護者の指導監督のもとで使用させてください。
- (3)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

製造
番号

使用
期限

