

ご使用に際し、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

⚠️【使用上の注意】

【相談すること】

- 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
(1)薬などによりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
(2)湿潤やただれのひどい人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)本剤のついた手で、目や粘膜にふれないでください。
- (4)他の容器に入れかえないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (5)使用期限(外箱及び容器に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

◆お問い合わせ先◆
フリーダイヤル 0120-86-8998

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

【効能・効果】ひび、あかぎれ、しもやけ

【用法・用量】1日数回、適量を患部に塗布してください

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1)定められた用法・用量をお守りください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

【成分・分量】100g中

トコフェロール酢酸エステル……0.2g

アラントイン……0.2g

パンテノール……1.0g

グリセリン……40.0g

グリチルリチン酸二カリウム……0.5g

イソプロピルメチルフェノール……0.1g

添加物：ステアリルアルコール、ベヘニルアルコール、ベヘン酸、ステアリン酸グリセリン、ステアリン酸ポリオキシシル、ミリスチン酸イソプロピル、ジメチルポリシロキサン、パラベン、エドト酸Na水和物、pH調節剤

発売元

ラクール薬品販売株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

製造販売元

三友薬品株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号