

開け口

販売名：
ケアルンHPクリーム

第2類 医薬品

特徴

- **ヘパリン類似物質 0.3%配合**
保湿作用・抗炎症作用・血行促進作用があります。
- **油性クリーム（W/O型）**
肌にしっかり密着し、外部の刺激から患部を守ります。
- **赤ちゃんから使えます。**
無香料・無着色でステロイドやエタノールは入っていません。

外部からの刺激をブロックします



(イメージ図)

肌には本来バリア機能があり、水分の蒸発や外部からの刺激をブロックし、からだを守っています。

一方、皮膚が乾燥した状態（バリア機能が低下した状態）になると、水分が逃げやすく、外部からの刺激に弱い状態になってしまいます。ケアルンHPクリームは、高い保湿効果で乾燥による肌トラブルに効果を発揮します。

※出血のある傷口には使用しないでください（血が止まりにくくなる場合があります。）。

※顔面のさす・やけどのあとには使用しないでください。

※かさぶたには使用しないでください。

発売元 **新日製薬株式会社**

岐阜県岐阜市長良法久寺町16番地

製造販売元 **新生薬品株式会社**

富山県中新川郡上市町横越1番1

問い合わせ先 新生薬品株式会社

電話 (076)472-0361

受付時間：9:00～17:00（土、祝日を除く）

用法・用量

1日1～数回、適量を患部にすりこむか、又はガーゼなどにのびせて貼ってください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合にはすぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には医師の診察を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。

効能・効果

手指の荒れ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかぎれ、乾皮症、小児の乾燥性皮膚、しもやけ（ただれを除く）、さす・やけどのあと（皮肉のしこり・つっぱり（顔面を除く）、打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛

成分・分量 100g中

ヘパリン類似物質……………0.3g
添加物として、ミリスチン酸イソプロピル、オクチルドデカノール、ジメチルポリシロキサン、グリセリン脂肪酸エステル、サラシミツロウ、パルミチン酸デキストリン、1,3-ブチレングリコール、濃グリセリン、硫酸マグネシウム水合物、パラオキシ安息香酸メチル、精製水を含有します。

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。
4. 使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



第2類医薬品

乾燥肌の保湿・改善に ケアルンHPクリーム

ご使用に際して、外箱の説明文書を必ずお読みください。また、必要ときに読めるよう大切に保管してください。

使用上の注意

❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 次の人は使用しないでください
出血性血液疾患（血友病、血小板減少症、紫斑病など）の人。
2. わずかな出血でも重大な結果をきたすことが予想される人（血液凝固抑制作用を有し出血を助長するおそれがあります。）。
2. 次の部位には使用しないでください
目や目の周囲、粘膜（口唇、鼻洞、膈間）。

📌 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、紫斑

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください