




日本薬局方  
**グリセリン**  
販売名：グリセリン「昭和」P  
100mL  
第2類医薬品

第2類医薬品 100mL

日本薬局方  
**グリセリン**  
販売名：グリセリン「昭和」P

ひび・あかぎれ、便秘



昭和製薬株式会社  
大阪府守口市南寺方東通1-4-12  
お問い合わせ 06-6996-5111


本品は植物由来原料(ヤシ油)から製造されています。

**効能・効果**  
(外 用)ひび、あかぎれ  
(洗腸用)便秘

**用法・用量**  
(外 用)  
脱脂綿、ガーゼ等に浸して患部に軽く塗る。  
(洗腸用)  
本剤を精製水で2倍に希釈し、洗腸器を用いて直腸内に注入する。注入量は希釈後の溶液の量として次の通りとする。  
12歳以上 1回30mL  
6歳以上12歳未満 1回20mL  
1歳以上 6歳未満 1回10mL  
1歳未満 1回 5mL  
効果のみられないときは、さらに同じ量をもう一度直腸内に注入する。

**成分・分量**  
グリセリン84～87%含む。

製造  
番号  
使用  
期限



**△ 使用上の注意 (外用)**

用法・用量に関する注意  
(1)外用にのみ使用し、内服しないこと。  
(2)目に入らないように注意し、万一に入ったときは、すぐに水又はぬるま湯で洗い流すこと。  
(3)小児に使用する場合には、特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用すること。

**保管及び取扱い上の注意**

(1)小児の手の届かない所に保管すること。  
(2)直射日光を避け、なるべく涼しい所に密栓して保管すること。  
(3)誤用を避け、品質を保持するために、他の容器に入れかえないこと。  
(4)希釈するための容器は清潔なものを使用すること。  
(5)使用残液は捨てること。  
(6)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931



**△ 使用上の注意 (洗腸用)**

△ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が重なりやすくなる。)  
連用しないこと [常用すると、効果が減弱し(いわゆる「なれ」が生じ)薬剤に頼りがちになる。]

**■ 相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。  
(1)医師の治療を受けている人。  
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(流産の危険性があるので使用しないことが望ましい。)  
(3)1歳未満の乳児。  
(4)高齢者。  
(5)次の症状のある人。  
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐、痔出血  
(6)次の診断を受けた人。  
心臓病
2. 2～3回使用しても排便がない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

**■ その他の注意**

次の症状があらわれることがある。  
立ちくらみ、肛門部の熱感、不快感

用法・用量に関する注意  
(1)定められた濃度に希釈してよくかき混ぜること。  
(2)本剤使用後は、便意が強まるまでしばらくがまんすること。(使用後すぐに排便を試みると薬剤のみ排出され、効果がみられないことがある。)  
(3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。  
(4)特に乳幼児の場合には、安易な使用を避け、洗腸に頼りすぎないように注意すること。  
(5)洗腸にのみ使用すること。  
(6)洗腸器を無理に挿入すると、直腸粘膜を傷つけるおそれがあるので注意すること。

RK70-35T

0 1 2 4 8

0002-0753

10Ando1210