

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

〈ひび・あかぎれ治療薬〉


ヒビヒフル

第3類医薬品

ヒビヒフルは、殺菌効果のあるイソプロピルメチルフェノール、消炎、鎮痛効果のサリチル酸メチル、患部の修復を促すトコフェロール酢酸エステルを配合したクリーム剤です。3つの効果がひび、あかぎれを効果的に改善します。


3つの効果でひび、あかぎれに効く

①殺菌効果




イソプロピルメチルフェノール
患部を殺菌します。

②消炎、抗炎症効果



サリチル酸メチル
腫れ・炎症を鎮めます。

③修復効果



トコフェロール酢酸エステル
患部の修復を促します。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

次の部位には使用しないでください。

- (1)目や目の周囲、粘膜(例えば唇等)
- (2)湿疹、かぶれ



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
 - (1)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (2)湿潤やただれのひどい人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

【効能・効果】

ひび、あかぎれ、しもやけ、かゆみ

【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗布または塗擦してください。

【用法・用量についての注意】

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3)外用にのみ使用してください。

【成分・分量】 100g中に次の成分を含みます。

成分	分量	はたらき
トコフェロール酢酸エステル	2.0g	血行を促進し、患部の修復を助けます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	殺菌効果があります。
l-メントール	1.35g	清涼感を与え、痛みをやわらげます。
d _l -カンフル	9.6g	清涼感を与え、痛みをやわらげます。
サリチル酸メチル	3.0g	痛みやはれを鎮めます。

添加物としてユーカリ油、テレピン油、ステアリン酸、ステアリルアルコール、モノステアリン酸グリセリン、セチル硫酸ナトリウム、プロピレングリコール、トリエタノールアミン、カルボキシビニルポリマーを含有します。

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。
- (5)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。
なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。

本品についてのお問い合わせはお買い求めのお店または下記にお願い致します。

万協製薬株式会社「お客様相談室」

電話 0598-30-5376

受付時間 10:00~17:00

(ただし、土、日、祝祭日は除きます。)



発売元

日邦薬品工業株式会社

東京都渋谷区代々木3-46-16
<http://www.nippo-yakuhin.jp/>

製造販売元



万協製薬株式会社

三重県多気郡多気町五桂1169-142