

省資源化のため、箱が添付文書を兼ねています。

ご使用に際して、この箱の記載内容を必ず読んでください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

〈外皮用薬〉

販売名 ヘパロイドクリームα

第2類医薬品

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

1. 次の人は使用しないでください。

- (1) 出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病など)の人。
- (2) わずかな出血でも重大な結果をきたすことが予想される人。
(血液凝固抑制作用を有し出血を助長するおそれがあります)

2. 次の部位には使用しないでください。

目、粘膜(口腔、鼻腔、膣など)

⚑ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 濡潤やただれのひどい人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、紫斑

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

手指の荒れ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかぎれ、乾皮症、小児の乾燥性皮膚、しもやけ(ただれを除く)、きず・やけどのあと、皮膚のしこり・つっぱり(顔面を除く)、打身・ねんざのはれ・筋肉痛・関節痛

用法・用量

1日1~数回、適量を患部にすりこむか、又はガーゼ等にのばして貼ってください。

用法・用量に関する注意

(1) 定められた用法・用量を守ってください。(2) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(3) 外用にのみ使用してください。※出血のある傷口には使用しないでください。(血が止まりにくくなることがあります。)※顔面にある傷あと、やけどのあとには使用しないでください。(4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

成分・分量

(100g中)ヘパリン類似物質 0.3g、アラントイン 0.2g、トコフェロール酢酸エステル 0.5g 添加物:グリセリン、流動パラフィン、スクワラン、プロピレングリコール、ワセリン、グリセリン脂肪酸エステル、セレシン、パラベン、エデト酸Na、ヒアルロン酸Na

保管及び取扱い上の注意

(1) 本剤のついた手で、目などの粘膜に触れないでください。(2) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(3) 小児の手の届かない所に保管してください。(4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。

製造販売元 万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五桂1169-142

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

万協製薬株式会社「お客様相談室」

電話 0598-30-5376

受付時間 10:00~17:00

(ただし、土、日、祝日は除きます。)



MADE IN JAPAN