

開封口

省資源化のため、箱が添付文書を兼ねています。
ご使用に際して、この箱の記載内容を必ず読んでください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください。

- (1) 出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病など)の人。
- (2) わずかな出血でも重大な結果をきたすことが予想される人。(血液凝固抑制作用を有し出血を助長するおそれがあります)

2. 次の部位には使用しないでください。

目、粘膜(口腔、鼻腔、腔など)

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 潤滑やただれのひどい人。

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症状 |
|------|-----------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ、はれ、紫斑 |

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

第2類医薬品

販売名：へパロイド乳液α
(外用薬)

【成分・分量】(100g中)

ヘパリン類似物質……………0.3g
アラントイン……………0.2g
トコフェロール酢酸エステル…0.5g

添加物：プロピレングリコール、d-リピロリドンカルボン酸Na、ミリスチン酸イソプロピル、セトステアリルアルコール、ポリソルベート60、ポリオキシエチレンベヘニルエーテル、パラベン、エデト酸Na、ジブチルヒドロキシトルエン、pH調節剤、ヒアルロン酸Na

【効能・効果】

手指の荒れ、ひじ・ひざ・かかど・くるぶしの角化症、手足のひび・あかざれ、乾皮症、小児の乾燥性皮膚、しもやけ(ただれを除く)、さす・やけどのあとと皮膚のしこり・つっぱり(顔面を除く)、打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛

製造販売元

万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五桂 1169-142

万協製薬株式会社「お客様相談室」
電話 0598-30-5376
受付時間 10:00～17:00
(ただし、土、日、祝日は除きます。)

副作用被害救済制度 ☎ 0120(149)931

内容量：50g
MADE IN JAPAN



BANKYO

くり返す乾燥肌に!

へパロイド 乳液α

ヘパリン類似物質
保湿、抗炎症、血行促進成分

ビタミンE
血行促進成分

アラントイン
肌修復促進成分



へパロイド
乳液α
Heparoid
MILKY LOTION

ヘパリン類似物質配合
第2類医薬品 50g

50g

第2類医薬品

【用法・用量】

1日1～数回、適量を患部にすりこむか、又はガーゼ等にのぼして貼ってください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。
※出血のある傷口には使用しないでください。(血が止まりにくくなる場合があります)
※顔面にある傷あと、やけどのあとには使用しないでください。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 本剤のついた手で、目などの粘膜に触れないでください。
- (2) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。