

くり返す乾燥肌に!

ヘパロイド 乳液α

ヘパリン類似物質配合

第2類医薬品

50g

第2類医薬品

販売名:ヘパロイド乳液α
(外用薬)

【成分・分量】(100g中)

ヘパリン類似物質……………0.3g
アラントイン……………0.2g
トコフェロール酢酸エステル…0.5g

添加物:プロピレングリコール、dl-
ピロリドンカルボン酸Na、ミリスチ
ン酸イソプロピル、セトステアリルア
ルコール、ポリソルベート60、ポリオ
キシエチレンベヘニルエーテル、パ
ラベン、エデト酸Na、ジブチルヒド
ロキシトルエン、pH調節剤、ヒアル
ロン酸Na

【効能・効果】

手指の荒れ、ひじ・ひざ・かかと・
くるぶしの角化症、手足のひび・
あかぎれ、乾皮症、小児の乾燥性
皮膚、しもやけ(ただれを除く)、
きず・やけどのあとの皮膚のしこ
り・つっぱり(顔面を除く)、打身・
ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛

製造販売元

万協製薬株式会社

三重県多気郡多気町五桂 1169-142

万協製薬株式会社「お客様相談室」

電話 0598-30-5376

受付時間 10:00~17:00

(ただし、土、日、祝日は除きます。)

副作用被害救済制度 ☎ 0120(149)931

内容量: 50g

MADE IN JAPAN



くり返す乾燥肌に!

ヘパロイド

乳液α

ヘパリン類似物質

保湿、抗炎症、血行促進
成分

ビタミンE

血行促進
成分

アラントイン

肌修復促進
成分



50g

第2類医薬品

【用法・用量】

1日1~数回、適量を患部にすりこ
むか、又はガーゼ等にのぼして貼
ってください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を守
ってください。
- (2) 目に入らないよう注意してく
ださい。万一、目に入った場合に
は、すぐに水又はぬるま湯で
洗ってください。なお、症状が
重い場合には、眼科医の診
療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。
※出血のある傷口には使用しな
いください。(血が止まりにく
くなる場合があります。)
※顔面にある傷あと、やけどのあ
とには使用しないでください。
- (4) 小児に使用させる場合には、
保護者の指導監督のもとに
使用させてください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 本剤のついた手で、目などの
粘膜に触れないでください。
- (2) 直射日光の当たらない涼し
い所に密栓して保管してくだ
さい。
- (3) 小児の手の届かない所に保
管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでく
ださい。(誤用の原因になった
り品質が変わります。)
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使
用しないでください。なお、使
用期限内であっても、開封後
は品質保持の点からなるべく
早く使用してください。

開封口

省資源化のため、箱が添付文書を兼ねています。
ご使用に際して、この箱の記載内容を必ず読んでくださ
い。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副
作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください。

- (1) 出血性血液疾患(血友病、血小板
減少症、紫斑病など)の人。
- (2) わずかな出血でも重大な結果をき
たすことが予想される人。(血液凝
固抑制作用を有し出血を助長する
おそれがあります)

2. 次の部位には使用しないでください。

目、粘膜(口腔、鼻腔、膣など)

👤 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は
登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こ
したことがある人。
- (3) 湿潤やただれのひどい人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は
副作用の可能性があるので、直ちに使用
を中止し、この箱を持って医師、薬剤師
又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、紫斑

3. 5~6日間使用しても症状がよくならな
い場合は使用を中止し、この箱を持っ
て医師、薬剤師又は登録販売者に相
談してください。

1

MO03



4 535653 001525

上段:使用期限、下段:製造番号

開封口

省資源化のため、箱が添付文書を兼ねています。
ご使用に際して、この箱の記載内容を必ず読んで
ください。また、必要な時に読めるよう大切に
保管してください。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用
が起こりやすくなります)

- 次の人は使用しないでください。
(1) 出血性血液疾患(血友病、血小板減
少症、紫斑病など)の人。
(2) わずかな出血でも重大な結果をきた
すことが予想される人。(血液凝固抑
制作用を有し出血を助長するおそれ
があります)
- 次の部位には使用しないでください。
目、粘膜(口腔、鼻腔、膣など)



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録
販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こし
たことがある人。
(3) 湿潤やただれのひどい人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副
作用の可能性があるため、直ちに使用を
中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は
登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、紫斑

- 3.5～6日間使用しても症状がよくならない場
合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬
剤師又は登録販売者に相談してください。

第2類医薬品

販売名:ヘパロイド乳液α
(外用薬)

【成分・分量】(100g中)

ヘパリン類似物質………0.3g
アラントイン ……………0.2g
トコフェロール酢酸エステル
……………0.5g

添加物:プロピレングリコール、
dl-ピロリドンカルボン酸Na、ミ
スチン酸イソプロピル、セトステア
リルアルコール、ポリソルベート60、
ポリオキシエチレンベヘニルエー
テル、パラベン、エデト酸Na、ジブ
チルヒドロキシトルエン、希塩酸、
ジイソプロパノールアミン、ヒアル
ロン酸ナトリウム(2)

【効能・効果】

手指の荒れ、ひじ・ひざ・か
かと・くるぶしの角化症、手
足のひび・あかぎれ、乾皮
症、小児の乾燥性皮膚、しも
やけ(ただれを除く)、さず・
やけどのあとの皮膚のしこ
り・つっぱり(顔面を除く)、打
身・ねんざ後のはれ・筋肉
痛・関節痛

製造販売元

万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五桂1169-142

万協製薬株式会社「お客様相談室」
電話 0598-30-5376
受付時間 10:00～17:00
(ただし、土、日、祝日は除きます。)

副作用被害救済制度 ☎ 0120(149)931

内容量: 100g
MADE IN JAPAN



乾燥が気になる
お肌の治療薬

ヘパロイド乳液α

第2類医薬品 100g

乾燥が気になる
お肌の治療薬

ヘパロイド
乳液α

ヘパリン
類似物質

ビタミンE

アラントイン



第2類医薬品 100g

100g

第2類医薬品

【用法・用量】

1日1～数回、適量を患部に
すりこむか、又はガーゼ等に
のぼして貼ってください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を
守ってください。
- (2) 目に入らないよう注意して
ください。万一、目に入った場
合には、すぐに水又はぬるま
湯で洗ってください。なお、
症状が重い場合には、眼科
医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。
※出血のある傷口には使用し
ないでください。(血が止ま
りにくくなることがあります。)
※顔面にある傷あと、やけどの
あとには使用しないでくだ
さい。
- (4) 小児に使用させる場合に
は、保護者の指導監督のも
とに使用させてください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 本剤のついた手で、目などの
粘膜に触れないでください。
- (2) 直射日光の当たらない涼
しい所に密栓して保管して
ください。
- (3) 小児の手の届かない所に
保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないで
ください。(誤用の原因に
なったり品質が変わります。)
- (5) 使用期限を過ぎた製品は
使用しないでください。な
お、使用期限内であっても、
開封後は品質保持の点
からなるべく早く使用して
ください。

A2411

1



M003



4 535653 003024

使用期限

製造番号