

使用に際して、この添付文書を必ず読んでください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

# ヒルロイゼ 乳液α

第2類医薬品

## 外皮用薬

### 特長

- ・繰り返す乾燥肌の治療薬です。
- ・ヘパリン類似物質0.3%と皮膚修復作用を有するアラントイン、血行促進作用を有するトコフェロール酢酸エステルを配合し、乾燥により荒れた肌組織を修復します。
- ・さっぱりとした使用感で、伸びが良い乳液です。



### 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなります)

#### 1. 次の人は使用しないでください。

- (1) 出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病など)の人。
- (2) わざかな出血でも重大な結果をきたすことが予想される人。(血液凝固抑制作用を有し出血を助長するおそれがあります)

#### 2. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目や目の周囲、粘膜(口腔、鼻腔、瞼など)



### 相談すること

#### 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 湿潤やただれのひどい人。

#### 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状             |
|------|-----------------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ、はれ、紫斑 |

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

裏面もお読みください。

## 【効能・効果】

手指の荒れ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかぎれ、乾皮症、小児の乾燥性皮膚、しもやけ(ただれを除く)、きず・やけどのあととの皮膚のしこり・つっぱり(顔面を除く)、打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛

## 【用法・用量】

1日1～数回、適量を患部にすりこむか、又はガーゼ等にのばして貼ってください。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。  
※出血のある傷口には使用しないでください。(血が止まりにくくなることがあります)  
※顔面にある傷あと、やけどのあとには使用しないでください。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

## 【成分・分量】 100g中

| 成分名                  | 分量   |
|----------------------|------|
| ヘパリン類似物質             | 0.3g |
| アラントイン               | 0.2g |
| トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE) | 0.5g |

添加物として、プロピレングリコール、dl-ピロリドンカルボン酸Na、ミリスチン酸イソプロピル、セトステアリルアルコール、ポリソルベート60、ポリオキシエチレンベニルエーテル、パラベン、エデト酸Na、ジブチルヒドロキシトルエン、希塩酸、ジイソプロパノールアミン、ヒアルロン酸Naを含有します。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 本剤のついた手で、目などの粘膜に触れないでください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても、なるべく速やかに使用してください。

## 【内容量】 110 g

お問い合わせ先  
万協製薬株式会社「お客様相談室」  
電話 0598-30-5376  
受付時間 10:00～17:00  
(ただし、土、日、祝日は除きます)

発 売 元 協和薬品工業株式会社  
岐阜県岐阜市野一色二丁目8番6号

製造販売元 万協製薬株式会社  
三重県多気郡多気町五桂1169-142