

開封口

省資源化のため、箱が添付文書を兼ねています。
ご使用に際して、この箱の記載内容を必ず読んでください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください。

(1) 出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病など)の人。

(2) わずかな出血でも重大な結果をきたすことが予想される人。

(血液凝固抑制作用を有し出血を助長するおそれがあります)

2. 次の部位には使用しないでください。
目、粘膜(口腔、鼻腔、涙など)

▢ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(3) 潤滑やただれのひどい人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、紫斑
3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。	

第2類医薬品

販売名: ヘパロイドローション
(外皮用薬)

[成分・分量] (100g中)

ヘパリン類似物質 0.3g
添加物: グリセリン、1,3-ブチレン
グリコール、ジプロピレングリコール、pH調節剤、パラベン、キサンタンガム、フェノキシエタノール、ヒアルロン酸Na

[効能・効果]

手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかぎれ、乾皮症、小児の乾燥性皮膚、しもやけ(ただれを除く)、傷・火傷のあととの皮膚のしこり・つっぱり(顔面を除く)、打ち身・捻挫後のはれ・筋肉痛・関節痛

製造販売元

万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五桂1169-142

万協製薬株式会社「お客様相談室」

電話 0598-30-5376

受付時間 10:00~17:00

(ただし、土、日、祝日は除きます。)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

MADE IN JAPAN



BANKYO

乾燥が気になる お肌の治療薬

ヘパロイド ローション

ヘパリン類似物質配合



無香料・無着色
100g
第2類医薬品

【用法・用量】

1日1~数回、適量を患部に擦り込むか、又はガーゼ等にのばして貼ってください。

〈用法・用量に関する注意〉

(1) 定められた用法・用量を守ってください。

(2) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。

(3) 外用にのみ使用してください。
※ 出血のある傷口には使用しないでください。(血が止まりにくくなることがあります。)

※ 頭面にある傷あと、やけどのあとには使用しないでください。

(4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 本剤のついた手で、目などの粘膜に触れないでください。

(2) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。

(3) 小児の手の届かない所に保管してください。

(4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になります。)

(5) 期限超過を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。