

乾燥肌 治療薬

高保湿・油性クリーム

外用薬

販売名 第2類医薬品

ヒルドールα

成分・分量 (100g中)

ヘパリン類似物質…… 0.3g
アラントイン…………… 0.2g
トコフェール酢酸エステル… 0.5g
添加物:グリセリン、流動パラフィン、スクワラン、プロピレングリコール、白色ワセリン、グリセリン脂肪酸エステル、パラフィン、マイクロクリスタリンワックス、パラベン、エドト酸Na水和物、ヒアルロン酸Na(2)

効能・効果

手指の荒れ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかぎれ、乾皮症、小児の乾燥性皮膚、しもやけ(ただれを除く)、きず・やけどのあとの皮膚のしこり・つっぱり(顔面を除く)、打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛

製造販売元 万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五柱1169-142

万協製薬株式会社「お客様相談室」
電話 0598-30-5376
受付時間 10:00~17:00
(ただし、土、日、祝日は除きます)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

箱 MADE IN JAPAN



4 535653 002850

クリームタイプ

A&

ヘパリン 類似物質+

0.3g(100g中)

アラントイン ビタミンE 配合



乾燥肌 治療薬

高保湿・油性クリーム

MOISTURIZER

4つの作用で乾燥肌を改善

皮ふ保湿・抗炎症・血行促進・修復促進

低刺激性 無香料・無着色

100g

第2類医薬品

ヒルドールα

使用期限
製造番号

用法・用量

1日1~数回、適量を患部にすりこむか、又はガーゼ等にのばして貼ってください。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1)定められた用法・用量を守ってください。

(2)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。

(3)外用にのみ使用してください。※出血のある傷口には使用しないでください。(血が止まりにくくなる可能性があります。)

※顔面にある傷あと、やけどのあとには使用しないでください。

(4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

保管及び取扱い上の注意

(1)本剤のついた手で、目などの粘膜に触れないでください。(2)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。

(3)小児の手の届かない所に保管してください。

(4)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。

開封口

△ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください。

(1)出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病など)の人。

(2)わずかな出血でも重大な結果をきたすことが予想される人。(血液凝固抑制作用を有し出血を助長するおそれがあります)

2. 次の部位には使用しないでください。目、粘膜(口腔、鼻腔、膣など)



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1)医師の治療を受けている人。
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3)湿潤やただれのひどい人。

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、紫斑

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

B2602