

キズ・やけどのあとの皮膚のしこりに

**リレイジュHP**

外用薬 非ステロイドジェル

第2類医薬品

20g

ご使用に際して、この箱の説明書を必ずお読みください。また、必要ときに読めるよう大切に保管してください。

### 特徴

- ①有効成分へパリン類似物質が血流を改善することで皮膚の再生を促進し、皮膚の炎症を鎮めて正常な状態へ導きます。また、保湿作用により皮膚の角質の水分を保ち、肌に柔軟性を与えることで症状を改善します。
- ②ステロイドを使用していない、サラッとしたジェルタイプのお薬です。

### ⚠️ 使用上の注意

#### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください。  
出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病など)の人  
(血液凝固抑制作用を有し出血を助長するおそれがあります)
2. 次の部位には使用しないでください。  
目や目の周囲、粘膜(口腔、鼻腔、膈など)

#### 🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。  
(1) 医師の治療を受けている人  
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人  
(3) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

### 効能・効果

きず・やけどのあとの皮膚のしこり・つっぱり(顔面を除く)、手指の荒れ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかざれ、乾皮症、小児の乾燥性皮膚、しもやけ(ただれを除く)、打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛


### 用法・用量

1日1～数回、適量を患部にすりこむか、またはガーゼなどにのぼして貼ってください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。  
※出血のある傷口には使用しないでください。  
(血が止まりにくくなる場合があります)  
※かさぶたには使用しないでください。  
※顔面にある傷あと、やけどのあとには使用しないでください。

(チューブの穴の開け方)



キャップを逆にして、突起部をチューブの先に強く押し当ててください。

### 成分・分量 (100g中)

へパリン類似物質……0.3g(血行促進作用、抗炎症作用、保湿作用)  
添加物として、カルボキシビニルポリマー、ジイソプロパノールアミン、プロピレングリコール、イソプロパノール、香料を含有します。

### 保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製造販売元 **ジャパンメディック株式会社**

富山県富山市横越168

お客様相談窓口 ☎076-438-1107

受付時間月～金(祝日・年末年始を除く) 9:00～17:00

副作用救済制度 ☎0120-149-931