

<使用に際しては、説明文書をよく読むこと>

【使用上の注意】

<してはいけないこと> (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) ①出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病など)の人は使用しないこと。  
②わずかな出血でも重大な結果をきたすことが予想される人(血液凝固抑制作用を有し出血を助長するおそれがある。)  
③目や目の周囲、粘膜(口腔、鼻腔、膣など)には使用しないこと。  
<相談すること> ①次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。●医師の治療を受けている人。●薬などにアレルギー一症状を起こしたことがある人。●溜汗やただれのひどい人。②使用后、皮ふに発疹・発赤、かゆみ、はれ、紫斑があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。  
③5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。  
【保管および取扱い上の注意】

●直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。●小児の手が届かない所に保管すること。●他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わることがある。)  
●使用期限をすぎた製品は使用しないこと。



4 940233 201231

MADE IN JAPAN

2106A01

乾燥肌治療

第2類医薬品

タナール HPクリーム

ヘパリン類似物質配合

100g

【効能・効果】手指の荒れ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あざ、乾皮症、小児の乾燥性皮ふ、しもやけ(ただれを除く)、みず・やかどのあとの皮ふのしこり・つっぱり(顔面を除く)、打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛

【成分・分量】(本品100g中)ヘパリン類似物質0.3g、添加物としてエデト酸Na、トコフェロール酢酸エステル、ステアリルアルコール、トリエタノールアミン、プロピレングリコール、ポリソルベート60、パラベン、他5成分を含む。

【用法・用量】1日1～2回、適量を患部にすりこむか、又はガーゼなどにのぼして貼ってください。

<用法・用量に関連する注意> ●小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。●目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、異常がある場合には、医師に相談すること。●外用にのみ使用すること。※出血のある傷口には使用しないこと

製造販売元：ダイワ製薬株式会社  
〒634-0803 奈良県橿原市上品寺町 515

お客様相談室 TEL.0744-21-5588  
受付時間9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用検査済制度 ☎0120-149-931