

第2類医薬品

販売名:セナキュアEX

にきび治療薬 Acne Remedy

効能・効果 にきび

用法・用量 1日2回(朝・晩)、
適量を患部に塗布してく
ださい

<用法・用量に関連する注意>

(1)使用前に腕の内側等に少量を
塗布して一晩そのままにしておき、
翌朝、塗布部位に過敏症状(発疹・発
赤、かゆみ等)があらわれた場合は
使用をさけること(2)用法・用量を
厳守すること(3)小児に使用させ
る場合には、保護者の指導監督のも
とに使用させること(4)目に入ら
ないように注意すること。万一、目
に入った場合には、すぐに水又はぬ
るま湯で洗うこと。なお、症状が重
い場合には、眼科医の診療を受ける
こと(5)外用にのみ使用すること

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない
湿気の少ない涼しい所に
キャップをしっかりとめて
保管すること(2)小児の手
の届かない所に保管するこ
と(3)他の容器に入れ替え
ないこと(誤用の原因にな
ったり品質が変わる)(4)火気
に近づけないこと(エタノール
含有物)●衣服、寝具、家
具、床等につかないように十
分ご注意ください(材質に
よっては落ちにくいことや
変色・変質することがある)

成分・分量 100g中 サリチル酸 0.5g、エタノール 22.84g、アラントイン 0.2g、トコフェロール酢酸エステル 0.5g 添加物として、グリセリン、マクロゴール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、カルボキシビニルポリマー、ヒプロメロース、エデト酸Na、パラベン、2, 2', 2''-ニトリロトリエタノールを含有する

使用に際して、この説明書きを必ずお読
みください。また必要ときに読めるよ
う大切に保管してください。使用期限を
過ぎた製品は使用しないこと

△ 使用上の注意

× してはいけないこと (守らない
と現在の症状が悪化したり、副作用
が起こりやすくなる) **次の部位
には使用しないこと:**目や目の周囲

相談すること **1. 次の人は使用
前に医師、薬剤師又は登録販売者に
相談すること**(1)医師の治療を受
けている人(2)薬などによりアレ
ルギー症状を起こしたことがある
人(3)患部が広範囲の人(4)湿潤
やただれのひどい人(5)深い傷や
ひどいやけどの人(6)硬結(硬いし
こり)のある重症の人 **2. 使用後、
次の症状があらわれた場合は副作
用の可能性があるので、直ちに使用
を中止し、この箱を持って医師、薬剤
師又は登録販売者に相談すること**

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

**3. 2週間位使用しても症状がよ
くならない場合は使用を中止し、
この箱を持って医師、薬剤師又は
登録販売者に相談すること 4. そ
の他**(1)本剤は傷口があると、しみ
る、ヒリヒリする等の一過性の刺激
があらわれることがあります。刺激
が気になる場合は、使用を中止する
こと(2)本剤の使用により、皮膚が
多少乾燥したり、赤みがさしたりす
ることがあります。そのときは使用
を一時中止すること。再び使用する
ときは間隔をあけて使用すること

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

あったらいいな/をカタチにする

発売元 **小林製薬株式会社**
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-01

9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 **小林製薬株式会社**
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

MADE IN JAPAN

火気厳禁

第二石油類 危険等級Ⅲ
エタノール含有物 水溶性