

この添付文書は、使用前によくお読みください。
また、使用が終わるまで大切に保管してください。

第2類医薬品

にきび用薬

カラミラ[®] アクネ軟膏

カラミラアクネ軟膏の特徴

にきびの原因となる余分な皮脂を排出し、殺菌してにきびを治します。



相談すること

⚠ 使用上の注意

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3)患部が広範囲の人。
 - (4)湿潤やただれのひどい人。
 - (5)深い傷やひどいやけどの人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤・かゆみ
3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

にきび

【用法・用量】

1日数回、適量を患部及びその周辺の皮膚に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)使用に先立って少量をひじの内側に塗り、一晩そのままにしておいてください。翌朝、塗布部位に過敏症状（発疹・発赤・かゆみ等）があらわれた場合には使用しないでください。
- (2)用法及び用量を厳守してください。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (5)外用にのみ使用し、内服しないでください。

【成分・分量と作用】

100g中

成 分	分 量	作 用
イオウ	3 g	角質の軟化、殺菌作用があります。
レゾルシン	2 g	殺菌作用により患部の化膿をおさえます。

添加物として、亜硫酸水素Na、1,3-ブチレングリコール、パラベン、ミリストン酸イソプロピル、セタノール、ワセリン、流動パラフィン、セチル硫酸Na、トコフェロール酢酸エステル、ポリソルベート80、香料、フェニルエチルアルコールを含有します。

にきびの原因

- ・思春期から青春期のホルモンのアンバランス
- ・油脂の多い化粧品の使用
- ・糖分、脂肪分の多い食事
- ・ビタミンB₂、ビタミンB₆などのビタミンの欠乏
- ・不規則な生活

などが考えられます。規則正しい生活を心掛け、十分な睡眠をとり、野菜や果物をたっぷりとり、便秘しないように気をつけてください。

カラミラアクネ軟膏の上手な使い方

1. まず、きれいに洗顔してください。
2. カラミラアクネ軟膏を適量指先につけてにきびにおおいかぶせるように塗ってください。

※ご使用後はチューブの口やキャップをきれいにふき、しっかりキャップを閉めてください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)誤用をさけ品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4)使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記まで
ご連絡頂きますようお願い申し上げます。

福地製薬株式会社

滋賀県蒲生郡日野町寺尻824

電話：0748-52-2323

受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度
電話：0120-149-931

発 売 元

グレンツ メディカル株式会社

滋賀県蒲生郡日野町大谷東山341-32

製造販売元

福地製薬株式会社

滋賀県蒲生郡日野町寺尻824