

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

頭皮のかゆみしっしんに デオブ兰卡EX液

第2類医薬品

【特徴】

1. 5つの有効成分が、つらい頭皮のかゆみ、しっしんに効きます
2. プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル（アンテドラッグステロイド）配合
3. *l*-メントール、*dl*-カンフル配合でスーッと爽やかな使い心地です
4. 頭皮に塗布しやすいスプレータイプです

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 次の部位には使用しないでください。

- （1）水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等または化膿している患部。
- （2）創傷面、目の周囲、粘膜（例えば唇等）。

2. 長期連用しないでください。

3. 顔面には広範囲に使用しないでください。



■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談してください。

- （1）医師の治療を受けている人。
- （2）本人または家族がアレルギー体質の人。
- （3）薬や化粧品等によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- （4）患部が広範囲の人。
- （5）湿潤やただれのひどい人。
- （6）妊娠または妊娠していると思われる人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師または薬剤師に相談してください。

- （1）使用后、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮ふ（患部）	みずむし・たむし等の白癬菌、にきび、化膿症状、持続的な刺激感、発疹

- （2）5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

裏面もお読みください。

効能・効果

かゆみ、しっしん、皮ふ炎、かぶれ、じんましん、あせも、虫さされ

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

※患部に直接スプレーできます。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 患部が傷になってしまっている場合は、塗布したときにしみることがあります。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (5) 本剤は外用にのみ使用し内服しないでください。



成分・分量

100mL中に次の成分を含みます。

成分	分量	はたらき
フルドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル (アンデラッグステロイド剤 PVA)	0.15g	しっしん、皮ふ炎等の炎症をしずめます。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	1.0g	抗ヒスタミン作用により、かゆみの発生を抑えます。
<i>l</i> -メントール	3.5g	清涼感を与え、かゆみをやわらげます。
<i>dl</i> -カンフル	1.0g	
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	殺菌効果があります。

添加物としてジブチルヒドロキシトルエン、1,3-ブチレングリコール、エタノールを含有します。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 高温・直射日光をさけ、涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) メガネ、時計、アクセサリー、プラスチック類、化繊製品、皮革製品、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。
- (6) 染めた髪につくと色落ちすることがあります。
- (7) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願いいたします。

万協製薬株式会社

電話 0598-37-2088

受付時間 AM10:00~PM5:00
(ただし、土、日、祝祭日は除きます。)

発売元  日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3-46-16
<http://www.nippo-yakuhin.jp/>

製造販売元  万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五桂1169-142