

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
又、必要な時に読めるように大切に保管してください。



第2類医薬品

化膿性疾患・かぶれ治療薬 ダーマンS

皮膚は私たちの体を覆っている厚さ1~4ミリの膜で、外部からのさまざまな刺激を受けとめ内部を保護しています。この膜は年齢はもちろんのこと、季節、気温、大気の状態、皮脂・汗の分泌などに影響を受けます。また、皮膚の状態は個人差があり、傷を放置しておくと治りにくくなることもありますので、早めのお手当てと日頃の養生が大切です。ダーマンSは、化膿菌感染を防ぐスルファジアシン、炎症を抑える酸化亜鉛、かゆみを鎮めるジフェンヒドラミン塩酸塩、出血を止めるdL-メチルエフェドリン塩酸塩等を配合した軟膏剤です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3) 患部が広範囲の人。
 - (4) 湿潤やただれのひどい人。
 - (5) 深い傷やひどいやけどの人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください



関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

一般創傷、切傷、すり傷、化膿性疾患、急慢性湿疹、じんましん、痒疹、毒虫刺傷、かぶれ、やけど、小児ストロフルス

【用法・用量】

1日2～3回適量をガーゼにのばし、又は直接患部に塗擦又は塗布してください。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目にに入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (5)本剤の使用後、患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。




【成分・分量・はたらき】(100g中)

成 分	含 量	は た ら き
スルファジアジン	5.0g	化膿性感染を防ぎます。
酸化亜鉛	5.0g	局所吸収作用を有し、皮膚を保護し、傷などの乾燥を早めます。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	0.5g	患部のかゆみを鎮めます。
dL-メチルエフェドリン塩酸塩	0.5g	皮膚内の血管を収縮させ、出血を止めます。
卵黄油	0.5g	患部に栄養を与え、傷の治りを早くします。

添加物として、ポリエチレングリコール軟膏を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。(品質保持のため)



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店あるいは下記にお願いします。

万協製薬株式会社

電話0598-37-2088 受付時間AM10:00～PM5:00(ただし、土、日、祝祭日を除きます。)

発売元 **hoyu** ホーユー株式会社
名古屋市東区徳川一丁目501

製 造
販売元 **万協製薬株式会社**
三重県多気郡多気町五桂1169-142