



内容量 15g
MADE IN JAPAN
副作用被害救済制度
0120-149-931

使用期限
製造番号




第2類医薬品 デオブランカフ 〈しみない軟膏タイプ〉 15g

抗炎症成分 殺菌成分 組織修復成分

化膿性皮膚疾患に

第2類医薬品 デオブランカフ 15g

抗炎症成分 殺菌成分 組織修復成分 〈しみない軟膏タイプ〉



とびひ・化膿に

化膿性皮膚疾患に

非ステロイド

省資源化のため箱が添付文書を兼ねています。ご使用に際して、この箱の記載内容
を必ず読んでください。また、必要な時に読めるよう、大切に保管してください。

販売名 デオブランカフ
〈化膿性皮膚疾患用薬〉 第2類医薬品

△使用上の注意

⚠ 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 患部が広範囲の人。
 - 湿潤やただれのひどい人。
 - 深い傷やひびやけどの人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- 3.5～6日間使用しても症状がよくなる場合
は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師
又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

化膿性皮膚疾患（とびひ、めんちょう、毛のう炎）

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布するか、又はガーゼ等に延ばして貼ってください。

用法・用量に関連する注意

- 定められた用法・用量を厳守してください。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(4)外用にのみ使用してください。

成分・分量

(100g中)スルファジアジン5.0g、酸化亜鉛5.0g、アラントイン0.5g
添加物：d-ボルネオール、マクロゴール、ラノリン、ワセリン

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になりたり品質が変わります。)(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。

製造販売元
万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五辻 1169-142

万協製薬株式会社〔お客様相談室〕
電話 0598-30-5376
受付時間 10:00～17:00
(ただし、土、日、祝日は除きます。)

デオブランカフ

第2類医薬品
〈しみない軟膏タイプ〉

OPEN

デオブランカフ

〈しみない軟膏タイプ〉

第2類医薬品