



製造番号

使用期限

MADE IN JAPAN

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931


NEO TRADITIONAL JAPANESE MEDICINE



第2類医薬品 15g

しみない
軟膏タイプ

キルカミンF

3つの有効成分が化膿した皮膚炎に効く!
スルファジアジン 酸化亜鉛 アラントイン 配合

キルカミンF

化膿性皮膚疾患用薬
Drugs for pyogenic skin diseasesしみない
軟膏
タイプ

A2507

化膿性皮膚疾患用薬
Drugs for pyogenic skin diseases
とびひ・めんちょう・毛のう炎に!

非ステロイド お子様にも使えます!

省資源化のため、箱が添付文書を兼ねています。
ご使用に際して、この箱の記載内容を必ず読んでください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。販売名
キルカミンF
(化膿性皮膚疾患用薬)

第2類医薬品

使用上の注意

相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3) 患部が広範囲の人。
 - (4) 湿潤やただれのひどい人。
 - (5) 深い傷やひどいやけどの人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤・かゆみ
- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

製造販売元 万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五桂 1169-142万協製薬株式会社「お客様相談室」
電話 0598-30-5376
受付時間 10:00～17:00 (ただし、土、日、祝日は除きます)

効能・効果

化膿性皮膚疾患(とびひ、めんちょう、毛のう炎)

用法・用量

1 日数回、適量を患部に塗布するか、又はガゼ等に延ばして貼ってください。

用法・用量に関連する注意

(1) 定められた用法・用量を厳守してください。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(4) 外用にのみ使用してください。

成分・分量 (100g 中)

スルファジアジン 5.0g、酸化亜鉛 5.0g、アラントイン 0.5g
添加物：d-ボルネオール、マクロゴール、ラノリン、ワセリン

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。

化膿性皮膚疾患用薬
キルカミンF
第2類医薬品化膿性皮膚疾患用薬
キルカミンF
第2類医薬品