

第2類医薬品

ニキビ治療薬

アラジル

明治薬品

第2類医薬品

【販売名】

アラジル ニキビ治療薬 スプレー

【内容量】100mL 【効能】にきび

【成分・分量】100g中

アラントイン……………0.2g

サリチル酸……………0.5g

エタノール……………22.84g

添加物:グリセリン、パラオキシ
安息香酸メチル、クエン酸水和
物、クエン酸ナトリウム水和物

【用法・用量】

1日2回(朝・晩)、適量を患部に噴霧
してください。顔には適量を手にと
り塗布してください。

〈発売元・お問い合わせ先〉

明治薬品株式会社

富山県富山市三郷6番地

☎0120-53-3451

受付時間 平日9:00~17:00

〈製造販売元〉

万協製薬株式会社

三重県多気郡多気町五桂1169-142

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

MADE IN JAPAN



①



4 954007 028016

用法・用量に関連する注意

(1) 使用前に腕の内側などに少量を塗布して一晩そのままにしておき、翌朝、塗布部位に過敏症状(発疹・発赤、かゆみ等)があらわれた場合は使用をさけてください。(2) 用法・用量を厳守してください。(3) 本剤は傷口があると、しみる、ヒリヒリする等の一過性の刺激があらわれることがあります。刺激が気になる場合は、使用を中止してください。(4) 本剤の使用により、皮膚が多少乾燥したり、赤みがさしたりすることがあります。そのときは使用を一時中止してください。再び使用するときは間隔をあけて使用してください。(5) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(6) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(7) 外用にのみ使用してください。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早く使用してください。(5) 衣服、アクセサリ類、寝具、家具、床等につかないように十分に注意してください。(材質によっては落ちにくいことや変色・変質することがあります)(6) 残量が少なくなった場合、倒立(逆さ)使用では噴霧しにくくなることがあります。その場合には、正立で空噴きすると噴霧できるようになります。

角質を軟化して 角栓の排出を促進

第2類医薬品

アラントイン・サリチル酸配合
(有効成分)

アラジル

ニキビ治療薬
スプレー

100mL

明治薬品

ブツブツ ニキビの 原因菌を殺菌

省資源化のため、箱が添付文書
を兼ねています。ご使用に際
して、この箱の記載内容を必ず
読んでください。また、必要
時に読めるよう大切に保管し
てください。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)
次の部位には使用しないでください。
《目や目の周囲》

👤 相談すること

① 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人。
- (3) 患部が広範囲の人。
- (4) 湿潤やただれのひどい人。
- (5) 深い傷やひどいやけどの人。
- (6) 硬結(硬いこり)のある重症の人。

② 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

③ 2週間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

上段は使用期限、
下段は製造番号です