

## 化膿をともなうじゅくじゅく皮膚炎に

# 【販売名】ラウマーF

非ステロイド しみない軟膏タイプ

### とびひとは…

細菌が原因で起こる皮膚の感染症。患部が赤くなり、かゆみを伴い、周囲に水疱ができます。また、つぶすと症状が広がります。とびひになりそうな患部は定期的な観察が必要です。とびひの初期症状を見つけ、効果的な治療をしましょう。

### めんちょう・毛のう炎とは…

細菌が原因で起こる毛穴の感染症。黄色い膿を持ち、周囲が赤く腫れます。顔にできるものを特にめんちょうといいます。

### ラウマーFは

ラウマーFは、とびひ・化膿の原因菌（黄色ブドウ球菌、連鎖球菌等）をスルファジアジンが殺菌し、酸化亜鉛がじゅくじゅくした炎症をおさえ、アラントインが組織の生成を促し、治りを早める軟膏タイプの医薬品です。皮膚は外部の細菌や刺激から私たちの身体を守っていますが、肌にトラブル（かき傷、すり傷、きり傷、湿疹、かぶれなど）が起こっている状態では細菌に感染し化膿しやすくなります。感染や化膿を防ぐためにも、患部を清潔に保ち、さわったり無理やりウミを出すことは避け、早めに治療しましょう。

### ⚠ 使用上の注意



#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (3) 患部が広範囲の人
  - (4) 湿潤やただれのひどい人
  - (5) 深い傷やひどいやけどの人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 効能・効果

化膿性皮膚疾患（とびひ、めんちょう、毛のう炎）

## 用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布するか、又はガーゼ等に延ばして貼ってください。

### 【用法・用量に関する注意】


- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

- (3)目に入らないように注意してください。  
万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)外用にのみ使用してください。



### 【チューブの穴の開け方】

キャップを逆さにして、突起部をチューブの先に強く押し当ててください。

●チューブの折り(尾)の部分から先端に向けて順に押し出してください。  
(①→②)



●チューブが破れて薬剤がとび出るおそれがあります。  
折り曲げないでください。 折りたたまないでください。



## 成分・分量

(100g中)

成 分	含量	は た ら き
スルファジアジン	5.0g	殺菌作用により、患部の化膿を防ぎます。
酸化亜鉛	5.0g	患部の炎症をおさえ、痛みをしめます。
アラントイン	0.5g	肉芽形成作用により、新しい組織の生成を促進させます。

添加物として、d-ボルネオール、マクロゴール、ラノリン、ワセリンを含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない温氣の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

本品についてのお問い合わせは  
お買い求めのお店又は下記にお願い致します。  
**万協製薬株式会社「お客様相談室」**  
**電話 0598-30-5376**  
受付時間 10:00~17:00  
(ただし、土、日、祝日は除きます。)

発 売 元 **日新製薬株式会社**  
滋賀県甲賀市水口町宮の前2-62

製 造 販売元 **万協製薬株式会社**  
三重県多気郡多気町五桂1169-142