

背中 にきびに

にきび治療薬

スプレータイプ 第2類医薬品



背中 にきびに

背中の赤いブツブツに効く

セナエイド

にきび治療薬

殺菌

赤み
改善

組織
修復

1日2回

100mL

用法・用量に関する注意

- (1) 使用前に腕の内側などに少量を塗布して一晩そのままにしておき、翌朝、塗布部位に過敏症状(発疹・発赤、かゆみ等)があらわれた場合は使用をさせていただきます。
- (2) 用法・用量を厳守してください。
- (3) 本剤は傷口があると、しみる、ヒリヒリする等の一過性の刺激があらわれることがあります。刺激が気になる場合は、使用を中止してください。
- (4) 本剤の使用により、皮膚が多少乾燥したり、赤みがさしたりすることがあります。そのときは使用を一時中止してください。再び使用するときは間隔をあけて使用してください。
- (5) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させていただきます。
- (6) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (7) 外用にのみ使用してください。

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早く使用してください。
5. 衣服、アクセサリ類、寝具、家具、床等に付かないように十分に注意してください。(材質によっては落ちにくいことや変色・変質することがあります。)
6. 残量が少なくなった場合、倒立(逆さ)使用では噴霧しにくくなる場合があります。その場合は、正立で空噴きすると噴霧できるようになります。
7. 火気に近づけないでください。

A2512

上段は使用期限、
下段は製造番号です

省資源化のため、箱が添付文書を兼ねています。ご使用に際して、この箱の記載内容を必ず読んでください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください。

目や目の周囲



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3) 患部が広範囲の人。
 - (4) 湿潤やただれのひどい人。
 - (5) 深い傷やひどいやけどの人。
 - (6) 硬結(硬いしこり)のある重症の人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 2週間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

第2類医薬品

【販売名】セナエイド

【内容量】100mL

効能・効果

にきび

成分・分量(100g中)

イソプロピルメチルフェノール
.....0.3g
サリチル酸0.5g
グリチルリチン酸二カリウム
.....0.5g
アラントイン0.2g
エタノール22.84g
添加物:グリセリン、プロピレングリコール、マクロゴール4000、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60、水酸化ナトリウム、香料

用法・用量

1日2回(朝・晩)、適量を患部に噴霧してください。顔には適量を手にとり塗布してください。

【製造販売元】

万協製薬株式会社

三重県多気郡多気町五柱1169-142

万協製薬株式会社

「お客様相談室」

電話 0598-30-5376

受付時間 10:00~17:00

(ただし、土、日、祝日は除きます。)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



紙箱 MADE IN JAPAN



4 535653 003741