

開封口

第2類
医薬品

販売名：アクネザール

にきび治療薬

4つの有効成分配合

殺菌

エタノール

にきびの原因菌を殺菌します

組織
修復

アラントイン

炎症を鎮め、皮膚の組織修復を助けます

角質
軟化

サリチル酸

角質を軟化し、毛穴のつまりを改善します

抗炎症

グリチルリチン酸二カリウム

にきびによる炎症を抑えます

特徴

- 手の届きにくい背中にきびなどに、逆さにしても噴霧できるスプレータイプです。
- ひと吹きで広範囲に塗布できて、さっぱりとした使い心地です。
- 無香料・無着色
- オイルフリー

ご使用に際して、この箱の説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

火気厳禁
第二石油類 危険等級Ⅲ
水溶性 100mL (エタノール)



4 956622 110855

効能・効果 にきび

用法・用量 1日2回(朝・晩)、適量を患部に噴霧してください。顔には適量を手にとり塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 使用前に腕の内側などに少量を塗布して一晩そのままにしておき、翌朝、塗布部位に過敏症状(発疹・発赤、かゆみなど)があらわれた場合は使用をさけてください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用し、内服しないでください。

成分・分量 (100g中)

サリチル酸……………0.5g
エタノール……………22.84g
アラントイン……………0.2g
グリチルリチン酸二カリウム…0.5g
添加物:1,3-ブチレングリコール、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセルエーテル、クエン酸Na、クエン酸、リン酸水素Na、パラベン

保管及び取扱い上の注意

1. キャップを十分にしめて、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに保管してください。
2. 小児の手の届かないところに保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. 火気に近づけないでください。
5. 時計、めがね等の金属類、化学繊維の衣類、プラスチック類、塗装のしたある床・家具などに付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。
6. 衣類に付着した場合は、なるべく早く水又は洗剤で洗ってください。
7. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

背中 などの 二キビ

治療薬

逆さで使える
スプレー
タイプ

4つの有効成分で
広
がる
二キビに効く!

殺菌
エタノール組織
修復
アラントイン角質
軟化
サリチル酸抗炎症
グリチルリチン酸
二カリウム

⚠ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の部位には使用しないでください。
目や目の周囲

👤 **相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(3) 患部が広範囲の人
(4) 潤滑やただれのかゆい人
(5) 深い傷やひどいやけどの人
(6) 硬結(硬いこり)のある重症の人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性ありますので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 2週間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
4. その他
(1) 本剤は傷口があると、しみる、ヒリヒリする等の一過性の刺激があらわれることがあります。刺激が気になる場合は、使用を中止してください。
(2) 本剤の使用により、皮膚が多少乾燥したり、赤みがさしたりすることがあります。そのときは使用を一時中止してください。再び使用するときには間隔をあけて使用してください。

製造販売元

ジャパンメディック株式会社
富山県富山市横越168

お客様相談窓口

☎ 076-438-1107

受付時間：月～金 9:00～17:00
(祝日・年末年始を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

第2類医薬品

アクネザール®

無香料・無着色

100mL