

2019年3月

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

化膿性皮膚疾患用薬

新ヒフェース

第2類医薬品

新ヒフェースは各種の化膿菌に対して効果を有するサルファ剤であるスルファジアジンに抗炎症作用のあるグリチルレチン酸、局所麻酔作用のあるジブカイン塩酸塩を配合した化膿性皮膚疾患治療薬です。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 患部が広範囲の人。
(4) 湿潤やただれのひどい人。
(5) 深い傷やひどいやけどの人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
関係部位 症状
皮膚 発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

効能・効果

化膿性皮膚疾患(とびひ、めんちょう、毛のう炎)

用法・用量

通常1日1～数回適量を患部に塗布する。なお、症状により適宜増減する。

<用法・用量に関する注意>

- (1)用法・用量を厳守して下さい。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (3)目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
- (4)本剤は外用にのみ使用して下さい。

成分・分量

100g中

成 分	分 量
スルファジアジン	5.0g
グリチルレチン酸	0.3g
ジブカイン塩酸塩	0.1g

添加物として流動パラフィン、セタノール、プロピレン glycole、ソルビタン脂肪酸エステル、ラウリル硫酸Na、その他2成分を含有します。

保管及び取扱上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)配置期限(ケースに記載)を過ぎた製品は使用しないで下さい。
なお、配置期限内であっても、開封後はなるべく早く使用して下さい。

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの配置販売業者又は下記までご連絡下さい。

日本ゼトック株式会社

電話 0120-886-440

受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元

日本ゼトック株式会社

東京都新宿区西新宿1-26-2