

この説明書は、ご使用前に必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

にきび、吹き出物に

# DHC にきびクリーム

<にきび治療薬>

第2類医薬品

DHCにきびクリームは、患部の炎症を抑え、にきびの悪化を防ぐ成分と、アクネ菌を殺菌する成分を配合した、にきび治療薬です。大人のにきび（吹き出物）にもお使いいただけます。



## 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）  
次の部位には使用しないでください。  
目や目の周囲



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (3) 患部が広範囲の人。
  - (4) 湿潤やただれのひどい人。
  - (5) 深い傷やひどいやけどの人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、刺激感（ヒリヒリ感）、はれ（腫脹）、乾燥化（つっぱり感）

3. 1ヵ月位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## ■ 効能・効果

にきび、吹き出物

## ■ 用法・用量

1日数回、石けんで洗顔後、適量を患部に塗布してください。

### 【用法・用量に関連する注意】

- 1.にきび・吹き出物のある部位のみに使用し、周辺の広い部分には使用しないでください。
- 2.小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 3.目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 4.外用にのみ使用してください。

## ■ 成分・分量

100g中

成分	分量	作用
イブプロフェンピコノール	3.0g	炎症を抑え、にきびが悪化するのを防ぎます。
イソプロピルメチルフェノール	0.3g	殺菌作用でアクネ菌の増殖を抑えます。

添加物として、ラウリン酸マクロゴール、チオ硫酸Na、エデト酸Na、パラベン、カルボキシビニルポリマー、ジイソプロパノールアミン、オクチルドデカノールを含有します。

## ■ 保管及び取扱い上の注意

- 1.直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 2.小児の手の届かない所に保管してください。
- 3.他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 4.使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

医薬品  
相談室

tel.044-233-2029

受付時間 9:00~17:00(日・祝日をのぞく)

DHC

製造販売元  
株式会社ディーエイチシー  
東京都港区南麻布2-7-1

0120-333-906 www.dhc.co.jp