

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して立てて保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)火気に近づけないでください。
- (5)メガネ、時計、アクセサリーなどの金属類、化粧の衣類、プラスチック類、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないよう注意してください。
- (6)使用期限(外箱及び容器に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

※使用の際は薬液をスポンジに十分浸透させてから塗布してください。

火気厳禁

第二石油類 危険等級Ⅱ
エタノール含有物 水溶性

注意
事項

かゆみ 虫さされ

鎮痒消炎薬

アプレインクール Cool

4つの有効成分配合

かゆみを止める

ジフェンヒドラミン塩酸塩
リドカイン

清涼成分

l-メントール
dl-カンフル

非ステロイド性

第2類医薬品 80ml



効能・効果

かゆみ、虫さされ

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (4)定められた用法・用量を厳守してください。

成分・分量 100ml中

ジフェンヒドラミン塩酸塩
(かゆみ止め成分)……………2.0g
リドカイン(かゆみ止め成分)
……………0.5g
l-メントール(清涼感成分)…3.0g
dl-カンフル(清涼感成分)…2.0g
添加物・クエン酸水和物、ヒドロキシ
シプロピルセルロース、エタノール、
アジピン酸ジイソプロピル、
ハアセチルシよ糖、アンモニア

発売元

グロー薬品工業株式会社
大阪市中央区内淡路町1丁目3番2号
製造販売元

東光薬品工業株式会社
東京都足立区新田2丁目16番23号

お問い合わせ先

お客様相談窓口
03-3855-0101

こちら
開けてください

ご使用に際し、外箱に記載の説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

販売名 アプレイン クール

⚠ 使用上の注意

★ 相談すること

- 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3)湿潤やただれのひどい人。
- 2.使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状 |
|------|--------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ、はれ |

- 3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

