

使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。
また、必要な時に読めるよう大切に保管すること。

販売名：液体ムヒベビー

鎮痒消炎剤 第3類医薬品

お肌にしめないかゆみ止め かゆみ・虫さされ・あせもに



使用上の注意

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。(3) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- | 関係部位 | 症 状 |
|------|--------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ、はれ |
3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効 能 かゆみ、虫さされ、あせも、かぶれ、しっしん、じんましん、皮膚炎、しもやけ、ただれ
用法・用量 1日数回、適量を患部に塗布する。

＜用法・用量に関連する注意＞

(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。本剤の使用開始目安年齢は生後3カ月以上。(2) 目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合(充血や痛みが持続したり、涙が止まらない場合等)には、眼科医の診療を受けること。(3) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないこと。

成分とのはたらき 有効成分(100g中)

成 分	分 量	は た ら き
ジフェンヒドラミン塩酸塩	2.0g	かゆみを止める。
パンテノール(プロビタミンB5)	1.0g	肌の正常なはたらきを助ける。

添加物としてヒドロキシエチルセルロース、リン酸二水素Na、ベンゼトニウム塩化物を含有する。

保管及び取り扱い上の注意 (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。(2) 小児の手のとどかない所に保管すること。(3) 他の容器に入れかえないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。(4) 使用期限(ケース底面及び容器底面に西暦年と月を記載)をすぎた製品は使用しないこと。使用期限内であっても、品質保持の点から開封後はなるべく早く使用すること。(5) 液もれを防ぐためキャップをしっかりと閉めること。

お子さまが誤って
液体ムヒベビーを口にした場合

①少しなめた程度では影響はみられないが、たくさん口にするると眠気があらわれることがある。②次の場合には、なるべく早く医師に診てもらうこと：大量に飲み込んだとき。めまい、はきけ、倦怠感(だるさ)、呼吸異常などがあるとき。

お客様相談窓口 ☎076-472-0911
〔月～金(祝日を除く) 9:00～17:00〕

製造販売元 **muhi**
株式会社 池田模範堂
富山県中新川郡上市町神田16番地