

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

かゆみがつらい皮膚炎に

〈鎮痒消炎薬〉

テレス[®]HiTM 軟膏

第②類医薬品

販売名：テレスハイ軟膏

テレスハイ軟膏は5つの有効成分を配合した軟膏剤で、「湿疹」や「皮膚炎」に優れた効果を発揮します。

- アンテドラッグステロイド剤「プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル」が湿疹、皮膚炎等の炎症やはれをしずめます。
- 2つのかゆみ止め成分「ジフェンヒドラミン」と「クロタミトン」が湿疹、皮膚炎等のかゆみをすばやく抑えます。
- 殺菌剤「イソプロピルメチルフェノール」が患部の感染を防ぎます。
- 「トコフェロール酢酸エステル」が患部の血行を促進して治療を助けます。

テレスハイご使用のみなさまへ

主成分としてテレスハイに配合されているプレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステルは、アンテドラッグステロイド剤です。アンテドラッグは皮膚表面の患部で優れた効果を示し、体内に吸収されると作用の弱い物質に分解される、というユニークな特徴を持っています。アンテドラッグは、有効性と安全性の両立を目的として開発された薬剤ですが、用法・用量、使用上の注意を守り、正しくご使用ください。

テレスハイ軟膏は油脂性軟膏で、皮膚を保護して乾燥を防ぎます。



使用上の注意

❌ してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります】

1. 次の部位には使用しないでください
水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください
3. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 患部が広範囲の人。
(5) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

※【効能・効果】

皮膚炎、湿疹、かぶれ、あせも、かゆみ、虫さされ、じんましん

【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗擦してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。
- (5) この医薬品の塗擦後わずかにほてり(熱感)を感じるがありますが、ごく短時間のうちに消失します。
- (6) この医薬品を塗擦後、患部をラップフィルム等の通気性の悪いものでおおわないでください。

【成分・分量】


テレスハイ軟膏は白色半透明の軟膏で100g中の成分・分量及びその主なはたらきは次のとおりです。

成 分	分量	は たら き
プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	0.15g	抗炎症効果により、皮膚の炎症、はれ、かゆみを抑えます。
ジフェンヒドラミン	0.5g	抗ヒスタミン作用により皮膚のかゆみを抑えます。
クロタミトン	5.0g	皮膚への軽い刺激により、競合的にかゆみをしずめます。
トコフェロール酢酸エステル	0.5g	血行を促進し、治療を助けます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	殺菌効果により、かきこわし等による患部の化膿を防ぎます。

添加物として、セタノール、マイクロクリスタリンワックス、オクチルドデカノール、ワセリンを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限(外箱及びチューブに記載)をすぎた製品は使用しないでください。



【包装】

テレスハイ軟膏 5g、10g

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記をお願い申し上げます。

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

お客様相談室： ☎0120-834389

受付時間： 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

【製造販売元】

株式会社 池田模範堂

〒930-0394 富山県中新川郡上市町神田16番地

【販売元】

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

〒101-0065 東京都千代田区西神田3-5-2

【販売提携】

武田薬品工業株式会社