

[使用上の注意] してはいけないと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)次の部位には使用しないこと。創傷面、目の周囲、粘膜等 相談すること 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状(発疹・発赤・かゆみ・かぶれ等)を起こしたことがある人。(3) 湿潤やただれのひどい人。2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。皮ふ: 発疹・発赤・かゆみ、はれ 3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

[販売名] ムヒDsp 第3類医薬品 **[効能]** かゆみ、皮ふ炎、あせも、しつしん、かぶれ、じんましん、虫さざれ **[有効成分 原液100%中]** ジフェンヒドラミン1.0g、l-メントール5.0g、グリチルリチン酸二カリウム0.1g 添加物: 乳酸、l-乳酸Na、エタノール。噴射剤:DME **[用法・用量]** 1日数回、適量を患部に噴霧する。**(使用方法)** ノズルを必ず下に向け、患部にグッと押しつけて使用する。**[用法・用量に関する注意]** ● 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。● 目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。● 外用にのみ使用すること。● 同じ箇所に連続して3秒以上噴霧しないこと。 **[保管及び取り扱い上の注意]** ● 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。● 小児の手のとどかない所に保管すること。● 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わること)。● 缶のさびを防ぐため、水廻りや湿気の多い場所に置かないこと。● 次の物には付着させないこと(変質する場合がある)。床や家具などの塗装面、メガネ、時計、アクセサリー類、プラスチック類、化織製品、皮革製品、寝具等。● 捨てる時は、火気のない戸外で噴射音が消えるまでノズルを紙ごみ等に押し付けてガスを抜くこと。● 使用期限(缶底面に記載)をすぎた製品は使用しないこと。※本品は透明フィルムで包装しています。

(本剤にステロイド成分は配合されていません)

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

- ① 炎や火気の近くで使用しないこと。
 - ② 火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
 - ③ 高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所やストーブ、ファンヒーターの近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
 - ④ 火の中に入れないこと。
 - ⑤ 使い切って捨てること。
- 高圧ガス:DME

製造販売元

muhi

株式会社 池田模範堂
富山県中新川郡上市町神田16番地

お客様相談窓口

☎ 076-472-0911
(平日 9:00 ~ 17:00)



外装フィルム
キャップ
ノズル
金属:缶

⑥ 登録商標
TT01

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931



かゆみ・皮ふ炎

ムヒHD^{sp}

爽快
ジカジェット

muhi

100mL

第3類
医薬品

鎮痒消炎剤